

Mat.
med.
o.
154a

ARZNEIVERORDNUNGEN

der

Strassburger medic. Klinik

52,

ARZNEI-VERORDNUNGEN

der

Städtischen medic. Klinik

Mat. med.
o.

154^a



Die gebräuchlichsten
ARZNEIVERORDNUNGEN

der
medizinischen Klinik und Poliklinik

zu
Strassburg.

~~~~~  
Zusammengestellt

von

**Dr. S. RABOW,**

Erstem Assistenzarzt der medizinischen Klinik.



Dr. Rabow

**Strassburg**

**C. F. SCHMIDT'S UNIVERSITÄTS-BUCHHANDLUNG**

(FRIEDR. BULL)

**1874**







## Vorwort.

---

Das vorliegende Büchlein, welches ich mit Genehmigung und freundlicher Unterstützung des Herrn Professor Leyden zusammengestellt habe, enthält die hauptsächlichsten in der hiesigen medicinischen Klinik und Poliklinik in Anwendung kommenden Verordnungsweisen und Medicamente. Es soll einem Bedürfniss abhelfen, das sich hier, wie auch an andern Kliniken herausgestellt hat, indem es dem Studirenden die Receptformen fertig in die Hand giebt, welche bei der Vorstellung von Kranken nicht jedes Mal dictirt und wiederholt werden können. Aehnliche Einrichtungen sind deshalb bereits auch an einigen andern Orten getroffen worden.

Dieses Compendium macht in keiner Weise einen Anspruch auf Vollständigkeit. Es soll nur den klinischen Unterricht nach einer Richtung hin erleichtern und unterstützen. Diejenigen Studenten, welche einige Semester die Klinik besuchen, lernen mit den hierin enthaltenen Medicamenten umgehen und haben somit für die




spätere Praxis eine nicht allzukärgliche Grundlage, welche sie durch eigene Erfahrungen und anderweitige Studien vermehren und erweitern können.

Um die practische Brauchbarkeit des Büchleins zu erhöhen, habe ich nicht allein die Dosen und Maximaldosen beigegeben, sondern auch einigermaßen ein Merkmal für die Preise der einzelnen Verordnungen hinzugefügt. Bei einigen Medicamenten ist der Preis direct angegeben, sodann aber habe ich diejenigen Recepte, die besonders billig sind, sich daher für die Poliklinik und Armenpraxis eignen, mit einem \*, und diejenigen, welche wegen ihres hohen Preises für die elegante Praxis passen, in der poliklinischen und Spitalpraxis aber nur ausnahmsweise in Anwendung zu bringen sind, mit einem † versehen.

An die Receptverordnungen schliessen sich die bedeutendsten Bäder- und Kurorte an, die ja ebenfalls sehr oft beim klinischen Unterricht zur Erwähnung kommen. Ich habe mich bemüht, dieselben in einer möglichst übersichtlichen Weise zusammenzustellen.

Strassburg i/E., im Januar 1874.

**Dr. Rabow.**





## Inhaltsverzeichnis.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seite. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Gruppierung der Arzneimittel . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1      |
| Acida. — Adstringentia. — Amara. — Antiparasitica. —<br>Antipyretica et Antiphlogistica. — Derivantia. — Des-<br>inficientia. — Diaphoretica. — Diuretica. — Emetica.<br>Excitantia. — Expectorantia. — Hæmostatica. —<br>Laxantia. — Metalle, Metalloide und deren Verbindun-<br>gen. — Narcotica. — Nervina. — Nutrientia et Emol-<br>lientia. — Tonica. — Bäder. |        |
| 2. Gewichts- und Maassbestimmungen. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5      |
| 3. Medicamente und Receptformeln in alphabe-<br>tischer Anordnung . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6      |
| 4. Anhang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| a) Mittel zur Inhalation. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 37     |
| b) Mittel zur subcutanen Injection . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37     |
| c) Uebersicht der wichtigsten Bäder und Kur-<br>orte . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37     |
| I. Seebäder. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37     |
| II. Soolbäder . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 37     |
| III. Kochsalzmineralquellen . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 38     |
| IV. Jod- und bromhaltige Soolen . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38     |
| V. Schwefelbäder . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38     |
| VI. Indifferente Thermen . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 38     |
| VII. Eisen- und Stahlbäder. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38     |



|                                          | Seite. |
|------------------------------------------|--------|
| VIII. Alkalische Mineralwässer . . . . . | 38     |
| IX. Salinische Mineralwässer . . . . .   | 38     |
| X. Traubenkurorte . . . . .              | 39     |
| XI. Kurorte für Lungenkranke . . . . .   | 39     |
| Pneumatische Cabinete . . . . .          | 39     |
| XII. Kaltwasser-Heilanstalten . . . . .  | 39     |
| d) Maximaldosen . . . . .                | 39     |









|                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. Introduction          | 1 |
| 2. Theoretical Framework | 2 |
| 3. Methodology           | 3 |
| 4. Results               | 4 |
| 5. Discussion            | 5 |
| 6. Conclusion            | 6 |
| 7. References            | 7 |
| 8. Appendix              | 8 |



# 1. Gruppierung der Arzneimittel.

## I. Acida.

### a) *Anorganische Säuren* :

Acidum muriat.  
— nitricum.  
— phosphoric.  
— sulphuricum.

### b) *Organische Säuren* :

Acidum aceticum.  
— citricum.  
— lacticum.  
— tartaricum.

## II. Adstringentia.

Acidum gallicum.  
Acidum tannicum.  
Alumen (Alumin. acet.).  
Argentum nitricum.  
Bismuth nitricum.  
Catechu.  
Cubebæ.  
Cuprum sulphur.  
Folia Salviæ.  
Folia uvæ ursi.  
Lignum Campechianum.  
Plumbum acet.  
Rad. Colomb.  
Rad. Ratanh.  
Zincum sulphur.

**Antidiarrhoica** (besonders bei Kindern) :

Ratanha, Lignum Campechianum, Catechu, Calomel, Kreosot, Eichelkaffee, Feigen, Nussblätterthee, trockne Heidelbeeren, Trauben.

Fruchteis (gegen **Sommerdiarrhoe**).

## III. Amara.

Cort. Chinæ.  
Folia aurant.  
Folia Card. bened.  
Herba absinth.  
Herb. centaur. minor.  
Lichen island.  
Rad. Calami.  
Rad. Gentian.  
Tinct. amar.  
Quassia cort.

## IV. Antiparasitica.

### a) *Antihelmintica* :

Flores Kusso.  
Kamala.  
Rad. Filicis.  
— Granati.  
Semen Cinæ.  
Santonin.  
Essigclysma.

### b) *Antiscabiosa, etc.*

Balsam. Peruvian.  
Benzin.  
Sapo virid.  
Styrax liquid.  
Sulphur.  
Petroleum.  
Unguent. cinereum.

## V. Antipyretica et Antiphlogistica.

a) Acid. muriat. phosphoric.  
Kali nitr. Saturation.  
Chinin.



Digitalis.  
Kalte Bäder.  
Tartarus stibiatus.  
Veratrin.

- b) Quecksilber (Unguent.  
ciner., Calomel).  
Blutentziehung, Eis.

## VI. Derivantia.

- a) Oleum Crotonis.  
Petroleum.  
Sinapismen.  
Tinctura Jodi.  
Vesicantien.

- b) *Spirituöse Einreibungen:*

Mixtur. oleosa balsamic.  
Spirit. æther.  
— angelic. comp.  
— camphorat.  
— formicar.  
— sinap.

(In den verschied. Mischungen.)

- c) *Linimente und Salben:*

Balsamum Nucistæ.  
Liniment. volatile.  
Oleum lini (mit aqua  
calcis).  
Opodeldoc.  
Oleum Hyoscyami coct.  
Sebum cervicis.  
Unguentum basilicum.  
— cerussæ.  
— kali jodati.  
— nervini.  
— tart. stibiati.  
— zinci.

## VII. Desinficientia.

- a) Acid. acet.  
— carbol.  
— pyrolignos.

Acid. sulphuric.  
Alumin. acet.  
Calcaria chlorat.  
Ferrum sulph. crud.  
Kali chloricum.  
Kali hypermangan.  
Oleum terebinth.  
Vinum camphorat.

- b) *Mundwässer und Pinselungen:*

Alumin. acet.  
Acid. carbol.  
Borax.  
Folia Salviæ.  
Kali chloric.  
Kali hypermangan.

## VIII. Diaphoretica.

Ammon. acet., carbon.,  
muriat.  
Flores aurantii.  
— Chamomillæ.  
— Sambuci.  
— Tiliæ.  
Pulvis Doweri.  
Saturation.  
Warme Bäder.  
Dampfbäder.  
Spiritusbäder.

## IX. Diuretica.

Ammon. acet., carb., hy-  
drochlor.  
Aqua petroselini.  
Digitalis.  
Diuret. Saturation.  
Fructus Juniperi.  
Kalisalze.  
Rad. Squillæ.  
Species diureticæ.



X. Hemicrania.

Ammoniacum  
Cinnamon  
Ginger  
Turmeric  
Vanilla

XI. Catarrhi.

Alumina  
Sulphur  
Magnesia  
Zinc  
Copper  
Iron  
Silver  
Gold  
Platina

XII. Expectorantia.

Ammoniacum  
Cinnamon  
Ginger  
Turmeric  
Vanilla  
Alumina  
Sulphur  
Magnesia  
Zinc  
Copper  
Iron  
Silver  
Gold  
Platina

XIII. Expectorantia.

Ammoniacum  
Cinnamon  
Ginger  
Turmeric  
Vanilla  
Alumina  
Sulphur  
Magnesia  
Zinc  
Copper  
Iron  
Silver  
Gold  
Platina

XIV. Expectorantia.

Ammoniacum  
Cinnamon

Ammoniacum  
Cinnamon  
Ginger  
Turmeric  
Vanilla  
Alumina  
Sulphur  
Magnesia  
Zinc  
Copper  
Iron  
Silver  
Gold  
Platina

XV. Expectorantia.

Ammoniacum  
Cinnamon  
Ginger  
Turmeric  
Vanilla  
Alumina  
Sulphur  
Magnesia  
Zinc  
Copper  
Iron  
Silver  
Gold  
Platina  
Alumina  
Sulphur  
Magnesia  
Zinc  
Copper  
Iron  
Silver  
Gold  
Platina  
Alumina  
Sulphur  
Magnesia  
Zinc  
Copper  
Iron  
Silver  
Gold  
Platina

Ammoniacum  
Cinnamon  
Ginger  
Turmeric  
Vanilla  
Alumina  
Sulphur  
Magnesia  
Zinc  
Copper  
Iron  
Silver  
Gold  
Platina



1. *Ammonia*  
 2. *Ammonia*  
 3. *Ammonia*  
 4. *Ammonia*  
 5. *Ammonia*  
 6. *Ammonia*  
 7. *Ammonia*  
 8. *Ammonia*  
 9. *Ammonia*  
 10. *Ammonia*

11. *Ammonia*  
 12. *Ammonia*  
 13. *Ammonia*  
 14. *Ammonia*  
 15. *Ammonia*  
 16. *Ammonia*  
 17. *Ammonia*  
 18. *Ammonia*  
 19. *Ammonia*  
 20. *Ammonia*

21. *Ammonia*  
 22. *Ammonia*  
 23. *Ammonia*  
 24. *Ammonia*  
 25. *Ammonia*  
 26. *Ammonia*  
 27. *Ammonia*  
 28. *Ammonia*  
 29. *Ammonia*  
 30. *Ammonia*

31. *Ammonia*  
 32. *Ammonia*  
 33. *Ammonia*  
 34. *Ammonia*  
 35. *Ammonia*  
 36. *Ammonia*  
 37. *Ammonia*  
 38. *Ammonia*  
 39. *Ammonia*  
 40. *Ammonia*

41. *Ammonia*  
 42. *Ammonia*  
 43. *Ammonia*  
 44. *Ammonia*  
 45. *Ammonia*  
 46. *Ammonia*  
 47. *Ammonia*  
 48. *Ammonia*  
 49. *Ammonia*  
 50. *Ammonia*

51. *Ammonia*  
 52. *Ammonia*  
 53. *Ammonia*  
 54. *Ammonia*  
 55. *Ammonia*  
 56. *Ammonia*  
 57. *Ammonia*  
 58. *Ammonia*  
 59. *Ammonia*  
 60. *Ammonia*

61. *Ammonia*  
 62. *Ammonia*  
 63. *Ammonia*  
 64. *Ammonia*  
 65. *Ammonia*  
 66. *Ammonia*  
 67. *Ammonia*  
 68. *Ammonia*  
 69. *Ammonia*  
 70. *Ammonia*

71. *Ammonia*  
 72. *Ammonia*  
 73. *Ammonia*  
 74. *Ammonia*  
 75. *Ammonia*  
 76. *Ammonia*  
 77. *Ammonia*  
 78. *Ammonia*  
 79. *Ammonia*  
 80. *Ammonia*

VIII. *Ammonia*

81. *Ammonia*  
 82. *Ammonia*  
 83. *Ammonia*  
 84. *Ammonia*  
 85. *Ammonia*  
 86. *Ammonia*  
 87. *Ammonia*  
 88. *Ammonia*  
 89. *Ammonia*  
 90. *Ammonia*

IX. *Ammonia*

91. *Ammonia*  
 92. *Ammonia*  
 93. *Ammonia*  
 94. *Ammonia*  
 95. *Ammonia*  
 96. *Ammonia*  
 97. *Ammonia*  
 98. *Ammonia*  
 99. *Ammonia*  
 100. *Ammonia*



## X. Emetica.

Apomorphin.  
Cuprum sulphur.  
Ipecacuanha.  
Tartar. stibiat.  
Zincum sulphuricum.

## XI. Excitantia.

Aether.  
Alcoholica.  
Ammoniak.  
Arnica.  
Benzoë.  
Caffee.  
Camphora.  
Moschus.  
Valeriana.  
Kalte Uebergiessungen.

## XII. Expectorantia.

- a) Ammon. anisat.  
— carbon.  
— muriat.  
— succinic.  
Balsamum Copaivæ.  
— Peruvian.  
Ipecacuanha.  
Benzoë.  
Senega.  
Stibium sulph. aurat.  
Species ad inf. pectorale.
- b) *Expectorirende Wässer* :  
Eger Franzensquelle.  
Emser Krähnchen.  
Obersalzbrunnen.  
Selterser- und Sodener-  
wasser, etc.
- c) *Milch- u. Molkenkuren.*

## XIII. Hæmostatica.

Alumen.  
Eis.

Ergotin.  
Hallersches Sauer.  
Kochsalz.  
Liquor ferri sesquichlor.  
Plumb. acet.  
Potio Choparti.  
Tannin.  
Terpentin.

## XIV. Laxantia.

### a) *Milde Abführmittel* :

Olei ricini.  
Calomel.  
Pulvis liquirit. comp.  
Magnesia usta.  
— carbon.

Für Kinder :

Syrup. Mannæ.  
Pulv. Magnesiae cum Rheo.

### b) *Salinische Abführmittel* :

Kali sulphuric.  
Natron sulphuric.  
Magnesia sulphur.  
Carlsbader Salz (natür-  
liches u. künstliches).  
Puellnaer  
Saidschützer } Wasser.  
Sedlitzer

### c) *Drastica.*

Aloë.  
Colocynthis.  
Cortex Frangulæ.  
Gummi gutt.  
Jalapp.  
Olei Crotonis.  
Senna.



**XV. Metalle, Metalloide und deren Verbindungen.**

Antimon, Argent., Arsen.,  
Bismuth, Blei, Brom, Calcium, Cuprum, Ferrum,  
Jod, Kalium, Lithium,  
Mangan, Magnesium, Natrium, Phosphor, Schwefel, Quecksilber, Zinc.

**XVI. Narcotica.**

Aether, Amylnitrit., Aqua amygd. amar., Atropin, Belladonna, Cannabis, Colchicum, Chloral, Chloroform, Digital, Dulcamar, Hyoscyam, Kalium bromat., Lupulin, Morphin, Opium, Secale corn., Strychnium, Veratrium.

**XVII. Nervina.**

Argent. nitric.  
Arsenik.  
Asa foetida.  
Auro-natr.-chlorat.  
Bromkalium.  
Castoreum.  
Flores arnic.  
Flores menth. piper.  
Valeriana.  
Zincum valerian.  
Bäder.

**XVIII. Nutrientia et Emollientia.**

Althææ rad.  
Arrow-root.  
Eier.  
Fleischextract, geschabt  
Fleisch, Fleischsolution.  
(Leube.)  
Glycerin.  
Gummi arab.  
Kumys.  
Leberthran.  
Milch.  
Malzextract.  
Nestlé'sches Mehl.  
Pepsin (mit Glycerin als  
Vinum pepsini).  
Salep.

**XIX. Tonica.**

Chinin.  
Ferrum (Eisenbäder).  
Weine und Bier.  
Sämmtliche Amara.

**XX. Bäder :**

Aromatische Bäder (Cal-  
mus, Chamillen).  
Eisen-  
Kiefernadeln-  
Kleien-  
Kochsalz-  
Malz-  
Moor-  
Schwefel-  
Sool-  
Bäder.



## 2. Gewichte und Massenverhältnisse

Die Gewichte der einzelnen Substanzen sind in der folgenden Tabelle angegeben. Die Massenverhältnisse sind in der folgenden Tabelle angegeben.

| 1000 Gramm von 1 Substanz |                |
|---------------------------|----------------|
| 360.0                     | von 1 Substanz |
| 20.0                      | von 1 Substanz |
| 3.75                      | von 1 Substanz |
| 1.75                      | von 1 Substanz |
| 0.45                      | von 1 Substanz |
| 0.01                      | von 1 Substanz |
| 0.075                     | von 1 Substanz |
| 0.05                      | von 1 Substanz |

- 1. Wasser
- 2. Salzsäure
- 3. Natriumchlorid
- 4. Kaliumchlorid
- 5. Ammoniumchlorid
- 6. Natriumhydroxid
- 7. Kaliumhydroxid
- 8. Ammoniumhydroxid
- 9. Natriumacetat
- 10. Kaliumacetat
- 11. Ammoniumacetat
- 12. Natriumformiat
- 13. Kaliumformiat
- 14. Ammoniumformiat
- 15. Natriumoxalat
- 16. Kaliumoxalat
- 17. Ammoniumoxalat
- 18. Natriumcitrat
- 19. Kaliumcitrat
- 20. Ammoniumcitrat

Die Massenverhältnisse sind in der folgenden Tabelle angegeben.

### Ergebnisse

Die Ergebnisse der Versuche sind in der folgenden Tabelle angegeben.

Die Ergebnisse der Versuche sind in der folgenden Tabelle angegeben.

Die Ergebnisse der Versuche sind in der folgenden Tabelle angegeben.

Die Ergebnisse der Versuche sind in der folgenden Tabelle angegeben.



1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880.

1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890.

1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900.

1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910.

1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920.

1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930.

1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940.

1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950.

1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960.

1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970.

1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980.

1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990.



## 2. Gewichts- und Maassbestimmungen.

Die Gewichtsmengen werden jetzt gewöhnlich nur nach Grammen bestimmt. Die Bezeichnung Gramm braucht nicht hinzugesetzt zu werden; z. B., 5,0 statt 5 Gramm, 0,06 statt 6 Centigramm.

|            |   |                           |                              |              |
|------------|---|---------------------------|------------------------------|--------------|
| 1000 Gramm | = | 1 Kilogramm               | =                            | 2 Zollpfund. |
| 500,0      | » | = $\frac{1}{2}$ Kilogramm | =                            | 1 Zollpfund. |
| 30,0       | » | =                         | 1 Unze ( $\frac{1}{3}$ ).    |              |
| 3,75       | » | =                         | 1 Drachme ( $\frac{1}{3}$ ). |              |
| 1,25       | » | =                         | 1 Scrupel ( $\frac{1}{3}$ ). |              |
| 0,06       | » | =                         | 1 gr. (Gran).                |              |
| 0,01       | » | =                         | $\frac{1}{6}$ gr.            |              |
| 0,0075     | » | =                         | $\frac{1}{8}$ gr.            |              |
| 0,006      | » | =                         | $\frac{1}{10}$ gr.           |              |

1 Liter enthält 1000 Cubikcentimeter.

1 Schoppen =  $\frac{1}{2}$  Liter = 500 Cubikcentimeter.

1 Weinglas oder Tassenkopf etwa 100,0 bis 150,0.

1 Esslöffel etwa 15,0—20,0.

1 Kinderlöffel =  $\frac{1}{2}$  Esslöffel.

1 Theelöffel =  $\frac{1}{4}$  Esslöffel.

1 Messerspitze = etwa  $\frac{1}{2}$  —  $\frac{1}{4}$  Theelöffel.

Die Pravaz'sche Spritze (mit 45 Theilstrichen) fasst im Durchschnitt 0,8—0,9 Gramm destillirtes Wasser.

### *Tropfen.*

Von wässerigen Flüssigkeiten, von Tincturen, von fetten, schweren ätherischen Oelen (wie oleum Caryophyll.), enthält 1 Gramm, 20 Tropfen.

Von den übrigen ätherischen Oelen, von Chloroform, Aether acet. und Spirit. æther., enthält 1 Gramm, 25 Tropfen.

Aether, 1 Gramm = 50 Tropfen.

**Anmerkung. Die Mengen**, welche wir in Solutionen, Mixturen, Infusen, Decocten, Emulsionen gewöhnlich verschreiben, sind für **Erwachsene**: 150,0—200,0 (circa 6 Unzen), 2ständl. 1 Esslöffel.

**Für Kinder**: 90,0—100,0 (3—4 Unzen), 2ständl. 1 Kinderlöffel.

Oder: 50,0—60,0, 2ständl. 1 Theelöffel.

Von *Tropfen* verschreiben wir in der Regel 15,0—20,0, 2—3  $\times$  tägl., 10—20—30 Tropfen.

Oder: 30,0—50,0, 2—3  $\times$  tägl.,  $\frac{1}{2}$ —1 Theelöffel.



### 3. Medicamente und Receptformeln in alphabetischer Anordnung.

**Absinthii herba.** Im Infus oder Decoct, 5,0—15,0 : 180,0.

† *Tinctura absinthii*, mehrmals tgl. zu 20—30 Tropfen.

Rp. Inf. herb. absinth., 10,0 : 180,0.

DS. 2stdl. 1 Essl.

(Amarum.)

**Acetum.** Innerlich zu Saturationen; äusserlich zu Mund- und Gurgelwässern, Clysmen und Waschungen.

**Acetum scilliticum.** S. Scilla.

**Acidum benzoicum** (*Flores Benzoes*). Innerlich 0,03—0,3 in Pulvern und zur subcut. Injection.

Rp. Acid. benzoic. 0,03—0,3.

Sacch. alb. 0,3.

Mf. Pulv.

D. t. dos. X.

S. 1—2stdl. 1 Pulv.

Rp. Flores benzoes.

Camphor. trit. ââ 0,06—0,1.

Sacch. alb. 0,3.

Mf. Pulv.

d. i. chart. cerat.

S. 1—2stdl. 1 Pulv.

Rp. Sol. acid. benzoic.

Camphor. ââ 1,0.

Spirit. vini 12,0.

DS. Zur subcut. Injection.

Mehrmals eine volle Spritze.

(Excitans.)

**Acidum carbol. cryst.** Solution. Inhalation. Mundwasser. Pinselung.

pro dosi 0,05!

— die 0,15!

Rp. Sol. acid. carbol. cryst.  
0,5—1,0 (!).

Aq. com. 180,0.

(Mit Zusatz v. Elæosacch.  
menth. pip. 10,0—15,0.)

DS. 2stdl. 1 Essl. (Auch zum  
Inhaliren.)

(Lungengangrän u. Abscess.)

Rp. Sol. acid. carbol. 10,0.

Aq. dest. 200,0.

DS. Aeusserlich.

(Zur Ausspritzung von Wunden.)

Rp. Sol. acid. carbol. 2,0—5,0/200,0

DS. Zu Mund- und Gurgelwasser,

Rp. Sol. acid. carbol. 2,5—5,0.

Glycerini pur. 50,0—100,0.

DS. Aeusserlich zu Pinselungen,  
(Croup und Diphtheritis.)

Rp. Acid. carbol. 2,5.

Spiritus 8,0.

Liq. Ammon. caust. 3,0.

Aq. dest. 5,0.

MDS. Riechmittel (bei Schnupfen)  
(Hager.)

**Acidum citricum.** Zur Bereitung von Limonaden 5,0 auf 1 Liter Wasser, ferner zu Saturationen und Brausepulvern.



Acid. carb. 9,2

Rub. jod. 1,

Jod. natr. a 0,10

Glycerin 2,

Alk. 3 Tzn. ~~Quercus~~ unguis felis lvs fass. 1/2,  
suntolij. Kugler 1,0 Chloralhydrat.

---

Mugl. ac. chrysoth. an. :

Mugl. sulc. 2,

logit. adu. exact.

Ac. croton. 10,

Ac. pargamin 0,5.

---



Acid salicyl 2, 5

al. oliv 10,

J. essent. J. Rubrum.

Cr. flav. 2

---



**Acidum gallicum.** Zu 0,1—0,5 in Pulvern.

Rp. Acid. gallic. 0,06—0,2.  
 Sacch. alb. 0,3.  
 Mf. Pulv. d. t. dos. XII.  
 S. 2—3stdl. 1 Pulv.  
 (Adstringens wie Tannin.)

**Acidum hydrochloricum.** Innerlich zu 1,0—2,0 : 200,0.

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Rp. Acid. hydrochlor.  | Rp. Acid. hydrochl. 0,5—1,0 : 500,0 |
| 1,0 : 180,0.           | Zu Einspritzungen in die            |
| Syrup. rubi Idæi 20,0. | Blase.                              |
| MDS. 2stdl. 1 Essl.    | (Cystitis.)                         |
| (Fieber, Dyspepsie.)   |                                     |

† **Acidum lacticum.** Zu Inhalationen (15—20 Tropfen auf 15,0 Wasser), auch zu Mund- und Gurgelwässern. 15,0 kosten ungefähr 2 Frs.

† Rp. Acid. lactici 5,0 : 100,0.  
 DS. Zum Inhaliren.  
 Anfangs halbstl., dann seltener.  
 (Croup und Diphtheritis.)

**Acidum phosphoricum.** Innerlich 1,0—3,0 : 200,0.

Rp. Acid. phosphor. 2,0 : 180,0.  
 Syrup. simpl. 20,0.  
 MDS. 2stdl. 1 Essl.  
 (Fieber, etc.)

**Acid. sulphur. dil.** Wie das Vorige.

*Mixtura sulphur. acid.* (Haller'sches Sauer). Mehrmals täglich 5-20 Tropfen in Zuckerwasser.

\* **Acidum tannicum.** Innerlich zu 0,03—0,2, mehrmals tgl. in Pulvern; äusserlich zum Inhaliren, zu Schnupf- u. Streupulvern; auch zu Injectionen in die Urethra (0,2—1,0 : 60,0).

|                                                              |                                    |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Rp. Acid. tannic. 0,03—0,12.                                 | Rp. Sol. acid. tannic. 0,5 : 80,0. |
| Sacch. alb. 0,3.                                             | Syrup. simpl. 20,0.                |
| Mf. Pulv. d. t. dos. XII.                                    | MDS. 2stdl. 1 Theel.               |
| S. 2stdl. 1 Pulv.                                            | (Diarrhoe der Kinder.)             |
| (Magenblutung, Nierenblutung,<br>Nephritis, Pyelonephritis.) |                                    |

Rp. Sol. acid. tannic.  
 1,0—5,0 : 200,0.  
 (Tinct. opii simpl. 1,0-2,0)  
 Zur Inhalation.

Rp. Acid. tannic.  
 Sacch. alb. 10,0.  
 Zum Schnupfen.  
 (Schnupfen, Epistaxis.)

**Acidum tartaricum.** Zu Limonaden und Brausepulvern.  
 S. Pulveres ærophori.

**Aether acetic. und sulphuricus.** Innerlich zu 5—20 Tropfen mehrmals gegen Erbrechen, Collaps. Aeusserlich gegen Kopfweg, und zu Clysmen. (Analepticum.)



**Aloë.** In Pillen zu 0,03—0,5.

Rp. Extr. Aloës.  
Extr. Rhei comp. ââ 3,0.  
(Extr. nuc. vomic. spirit. 0,3.)  
Pulv. et succi liquir. q. s.  
ut. f. Pill. Nr. 30.  
DS. Morgens u. Abends 2 Pill. (Abführpillen).

**Althææ radix.** Zu Pulvern, Species, Decoct.

Rp. Decoct. rad. Althææ 10,0—15,0 : 200,0.

*Syrupus Althææ.* Allein oder als Zusatz zu Expectorantien.

\* **Alumen crud.** Zu 0,1—1,0 mehrmals täglich in Pulvern, Solution, Gurgelwässern, Inhalation, Waschungen.

Rp. Aluminis 0,1—0,5.  
Sacch. alb. 0,5.  
Mf. Pulv. d. t. dos. X.  
S. Mehrmals tgl. 1 Pulv.  
(Adstringens.)

Rp. Alumin. 5,0—10,0 : 200,0.  
Zu Waschung und zum Gurgeln.  
(Angina.)

Rp. Alumin. 1,0—5,0.  
Aq. 200,0.  
DS. Zum Inhaliren.

† **Alumina acetica.**

Rp. Alumin. acet. 8,0 : 200,0.  
DS. Aeusserlich.  
(Verbandwasser, Mundwasser.)  
(Burrow.)

**Ammoniakpräparate :**

1) *Ammonium carbonicum.* In Solution zu 0,5—2,0.

Rp. Inf. rad. Ipecac. 0,3 : 80,0.  
Ammon. carb. 0,5—1,0.  
Syrup. simpl. 20,0.  
MDS. 2stdl. 1 Theel.  
(Pneumonie der Kinder.)

2) \* *Ammonium hydrochlor.* Salmiak.

Rp. Sol. Ammon. hydrochlor.  
Succi liquirit. ââ 5,0.  
Aq. font. 200,0.  
MDS. 2stdl. 1 Essl.  
(Mixture solvens.)  
Rp. Decoct. rad. Althææ 180,0.  
Ammon. muriat. 3,0.  
Syrup. liquirit. 20,0.  
MDS. 2stdl. 1 Essl.  
(Catarrh. bronchial.)

3) *Liquor Ammonii anisat.* Zu 2,0—6,0 : 200,0.

Rp. Inf. rad. Valerian. 6,0—10,0 : 180,0.  
Liquor Ammon. anis. 3,0—6,0.  
Syrup. Althææ 20,0.  
MDS. 2stdl. 1 Essl.



Al. pul. M. Dil. of  
Tub. jal. p.  
Sap. mar. aa 5, for 100

---



At June 10  
July 10  
Aug 10  
Sept 10  
Oct 10  
Nov 10  
Dec 10

\_\_\_\_\_

1. The first of the month was a fine day, with a light breeze from the north, and a few clouds in the sky. The temperature was about 60 degrees Fahrenheit.

2. On the second day, the weather was cloudy, with a light rain in the evening. The temperature was about 55 degrees Fahrenheit.

3. On the third day, the weather was clear, with a light breeze from the south, and a few clouds in the sky. The temperature was about 65 degrees Fahrenheit.

4. On the fourth day, the weather was cloudy, with a light rain in the evening. The temperature was about 55 degrees Fahrenheit.

5. On the fifth day, the weather was clear, with a light breeze from the north, and a few clouds in the sky. The temperature was about 60 degrees Fahrenheit.

6. On the sixth day, the weather was cloudy, with a light rain in the evening. The temperature was about 55 degrees Fahrenheit.

7. On the seventh day, the weather was clear, with a light breeze from the south, and a few clouds in the sky. The temperature was about 65 degrees Fahrenheit.

8. On the eighth day, the weather was cloudy, with a light rain in the evening. The temperature was about 55 degrees Fahrenheit.

9. On the ninth day, the weather was clear, with a light breeze from the north, and a few clouds in the sky. The temperature was about 60 degrees Fahrenheit.

10. On the tenth day, the weather was cloudy, with a light rain in the evening. The temperature was about 55 degrees Fahrenheit.

11. On the eleventh day, the weather was clear, with a light breeze from the south, and a few clouds in the sky. The temperature was about 65 degrees Fahrenheit.

12. On the twelfth day, the weather was cloudy, with a light rain in the evening. The temperature was about 55 degrees Fahrenheit.

13. On the thirteenth day, the weather was clear, with a light breeze from the north, and a few clouds in the sky. The temperature was about 60 degrees Fahrenheit.

14. On the fourteenth day, the weather was cloudy, with a light rain in the evening. The temperature was about 55 degrees Fahrenheit.

15. On the fifteenth day, the weather was clear, with a light breeze from the south, and a few clouds in the sky. The temperature was about 65 degrees Fahrenheit.

16. On the sixteenth day, the weather was cloudy, with a light rain in the evening. The temperature was about 55 degrees Fahrenheit.

17. On the seventeenth day, the weather was clear, with a light breeze from the north, and a few clouds in the sky. The temperature was about 60 degrees Fahrenheit.

18. On the eighteenth day, the weather was cloudy, with a light rain in the evening. The temperature was about 55 degrees Fahrenheit.

19. On the nineteenth day, the weather was clear, with a light breeze from the south, and a few clouds in the sky. The temperature was about 65 degrees Fahrenheit.

20. On the twentieth day, the weather was cloudy, with a light rain in the evening. The temperature was about 55 degrees Fahrenheit.

21. On the twenty-first day, the weather was clear, with a light breeze from the north, and a few clouds in the sky. The temperature was about 60 degrees Fahrenheit.

22. On the twenty-second day, the weather was cloudy, with a light rain in the evening. The temperature was about 55 degrees Fahrenheit.

23. On the twenty-third day, the weather was clear, with a light breeze from the south, and a few clouds in the sky. The temperature was about 65 degrees Fahrenheit.

24. On the twenty-fourth day, the weather was cloudy, with a light rain in the evening. The temperature was about 55 degrees Fahrenheit.

25. On the twenty-fifth day, the weather was clear, with a light breeze from the north, and a few clouds in the sky. The temperature was about 60 degrees Fahrenheit.



- 4) *Liquor Ammon. succinici*. Wie das Vorige.
- 5) *Linimentum volatile*.
- 6) \* *Linimentum saponat.-ammoniacat*.

**Amylnitrit.** Inhalationen auf Schwämmen, Taschentüchern, etc., zu 5—8 Tropfen.

(Hemicranie, Asthma, etc.)

**Antimonpräparate :**

- 1) *Stibio Kali tartaricum*. Tartarus stibiatus.

ad 0,2 pro dosi!

ad 1,0 pro die!

Rp. Tartari stibiat. 0,06.  
Pulv. rad. Ipecac. 1,0.  
Divide in part. II.  
S. Brechpulver.

- 2) *Unguent. tartari stibiati*. Pockensalbe, Erbsen- bis Boh-  
nengross, 1—2  $\times$  tgl. einzureiben.

- 3) *Stibium sulphurat. aurant*.

Rp. Stibii sulphur. aurant. 0,06.  
Opium puri 0,01—0,03.  
Sacch. alb. 0,3.  
Mf. Pulv. d. t. dos. XII.  
S. 2—3stdl. 1 Pulv.  
(Reizhusten, Asthma, Dyspnoe.)

Rp. Stibii sulphurat. aurant.  
Calomelan.  $\hat{a}\hat{a}$  0,01.  
Sacch. alb. 0,3.  
Mf. Pulv. d. t. dos. XII.  
S. 2—2stdl. 1 Pulv.  
(Bei Kindern als Plummer'sches Pulver.)

**Apomorphinum hydrochloricum.** Innerlich in Pulvern zu 0,01 pro dosi, gewöhnlich aber in subcutaner Injection zwischen 0,003 und 0,012.

Rp. Apomorphini hydrochl. 0,1.  
Aq. destill. 10,0.  
DS. Zur Injection  $\frac{3}{4}$  bis 1 ganze Spritze = 0,006—0,008.  
(Brechmittel.)

\* **Aqua amygdal. amar.** (Aqua laurocerasi).

ad 2,0 pro dosi!

ad 7,0 pro die!

Rp. Aq. amygdal. amar. 15,0.  
DS. 3  $\times$  tgl. 15—20 Tropfen.

Rp. Aq. laurocerasi 15,0.  
Morphii hydrochl. 0,15.  
MDS. 3  $\times$  tgl. 15 Tropfen.

(Cardialgie, Krämpfe, Erbrechen, etc.)



Rp. Aq. amygdal. amar. 2,0.  
Syrup. Althææ 60,0.  
(oder — Croci.  
— Ipecacuanhæ.  
— Morphii.  
— Senegæ.)

MDS. 2—3stdl. 1 Theel.  
(Reizhusten, Keuchhusten.)

\* **Aqua calcis.** Bis zu 500,0 pro die mit Milch oder Bouillon ââ.  
(Cystitis, Pyelitis, chron. Diarrhoe.)

Rp. Aq. calcariae.  
Olei lini ââ 100,0.

MDS. Aeusserlich.  
(Bei Verbrennungen und Eczem.)

**Aqua petroselini.** 200,0—400,0 pro die, auch als Zusatz zu diuretischen Mixturen.

Rp. Aq. petroselini 150,0.  
Liquor Ammon. acet.  
Oxymel scill. ââ 15,0.

MDS. 2stdl. 1 Essl.  
(Diureticum.)

**Argentum nitricum.** In Solution, Pillen, Pinselungen, Augewasser, Clysmata.

ad 0,03 pro dosi!

ad 0,2 pro die!

Rp. Sol. argent. nitr. 0,03—0,06.  
Aq. destill. 80,0.  
Glycerini pur. 20,0.

MD. In vitro nigr.

S. 2stdl. 1 Pappl.  
(Diarrhoe der Kinder, entsprechend stärker bei Erwachsenen.)

Rp. Argent. nitr. 0,12—0,2.  
Pulv. et  
Extr. Glycirrhiz. ââ q. s.

ut. f. Pill. Nr. 30.

S. 3 × tgl. 1—2 Pillen.  
(Ulcus ventriculi, Epilepsie, graue Degeneration, etc.)

Rp. Sol. argent. nitr. 0,5.  
Aq. destill. 30,0.

D. In vitro nigr.  
Aeusserlich zu Pinselungen.  
(Conjunctivitis, Laryngitis, Pharyngitis.)

Rp. Sol. argent. nitr. 0,18—0,36.  
Aq. destill. 90,0.

Tinct. opii simpl. gutt. XXX.  
DS. Mit der gleichen Menge Hafererschleim zum Clysmata für 3 Male.

(Chron. Diarrhoe, Dysenterie.)

**Unguentum nigrum.** Aeusserlich.

**Arnicae flores.** Inf. 10,0—15,0 : 180,0.



1. Die erste Aufgabe ist die, die in der ersten Aufgabe...

2. Die zweite Aufgabe ist die, die in der zweiten Aufgabe...

3. Die dritte Aufgabe ist die, die in der dritten Aufgabe...

4. Die vierte Aufgabe ist die, die in der vierten Aufgabe...

5. Die fünfte Aufgabe ist die, die in der fünften Aufgabe...

6. Die sechste Aufgabe ist die, die in der sechsten Aufgabe...

7. Die siebte Aufgabe ist die, die in der siebten Aufgabe...

8. Die achte Aufgabe ist die, die in der achten Aufgabe...

9. Die neunte Aufgabe ist die, die in der neunten Aufgabe...

10. Die zehnte Aufgabe ist die, die in der zehnten Aufgabe...

11. Die elfte Aufgabe ist die, die in der elften Aufgabe...

12. Die zwölfte Aufgabe ist die, die in der zwölften Aufgabe...

13. Die dreizehnte Aufgabe ist die, die in der dreizehnten Aufgabe...

14. Die vierzehnte Aufgabe ist die, die in der vierzehnten Aufgabe...

15. Die fünfzehnte Aufgabe ist die, die in der fünfzehnten Aufgabe...

16. Die sechzehnte Aufgabe ist die, die in der sechzehnten Aufgabe...

17. Die siebenzehnte Aufgabe ist die, die in der siebenzehnten Aufgabe...

18. Die achtzehnte Aufgabe ist die, die in der achtzehnten Aufgabe...

19. Die neunzehnte Aufgabe ist die, die in der neunzehnten Aufgabe...

20. Die zwanzigste Aufgabe ist die, die in der zwanzigsten Aufgabe...

21. Die einundzwanzigste Aufgabe ist die, die in der einundzwanzigsten Aufgabe...

22. Die zweiundzwanzigste Aufgabe ist die, die in der zweiundzwanzigsten Aufgabe...

23. Die dreiundzwanzigste Aufgabe ist die, die in der dreiundzwanzigsten Aufgabe...



*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*



*Tinctura arnicæ.* Aeusserlich zu Umschlägen bei Wunden und Quetschungen.

Rp. Inf. flor. arnicæ 5,0—15,0 : 180,0.  
Liq. ammon. anis. 3,0—5,0.  
Syrup. simpl. 20,0.  
MDS. 2stdl. 1 Essl.  
(Bei soporösen u. comatösen Zuständen.)

**Arrow-root.** S. *Amylum Marantæ.*

Mit Milch oder Bouillon täglich einige Theelöffel.  
(Nutriens für Säuglinge.)

**Arsenicum.** Sol. arsenical. Fowleri.

ad 0,4 pro dosi!

ad 2,0 pro die!

Rp. Sol. arsenical. Fowleri.  
Aq. amygd. amar. ââ 7,5.

MDS. 3×tgl. 2 Tropf., allmählig bis auf 3×tgl. 8 Tropf. zu steigen.  
(Nervinum. Gegen Neuralgie, Intermittens, Diabetes, Hautkrankheiten, etc.)

*Dec. arsen. 0,50  
Pep. nigr. p. 10, a. Nr  
Guaiac. arab. 1,50  
D. g. s. p. 200. 1 p = 0,00*

**Asa foetida.** In Pillen und Emulsion zu 0,2—0,5 mehrmals täglich.

*Tinctura asæ foetidæ.* Zu 20—50 Tropfen 3 bis 4× täglich.

Rp. Asæ foetid. 5,0—8,0.  
Succi liquirit. q. s.  
ut. f. Pill. Nr. 50.  
DS. 3×tgl. 3—5 Pill.  
(Hysterie, Chorea, etc.)

**Atropin.** S. *Belladonna.*

**Aurantii folia.** Im Infus. 15,0—20,0 : 200,0 und Species.  
(Amarum.)

**Bäder.**

I. a) *Aromatische Bäder.* Flores Chamomillæ, rad. Calami, Species aromat., 250,0—500,0 im Infus. dem Bade zugesetzt.  
(Lähmungen, Hysterie, Schwäche.)

b) *Eisen-, Stahl-, Moorbäder.* Ferrum sulphur. oxydulat. 50,0—200,0, gewöhnlich mit Argilla ââ. Tales dos. VI ad. oll. gris. (Chlorose, Beckenexsudate, etc.)

c) *Kiefernadelbäder.* 250,0—500,0 Extract der Fichten- oder Kiefernadel.  
(Rheumatismus, Nervenkrankheiten, Lähmungen.)

d) *Kleienbäder.* Ein Decoct von 1 bis 2 Kilogr. Weizenkleie dem Bade zugesetzt.  
(Hautkrankheiten, Rheumatismus, etc.)



- e) *Kochsalz-, Seesalzbäder*. 2 bis 3 Kilogr.
- f) *Malzbäder*. 2—3 Kilogr. Gerstenmalz, vorher gekocht und durchgeseiht. (Schwächezustände, bes. bei Kindern.)
- g) *Mutterlaugenbäder* von Kreuznach, Koesen, Rheme, Wittekind, 1 bis 2 Kilogr. zu einem Bade, dem noch  $\frac{1}{2}$  bis 1 Kilogr. Kochsalz hinzuzusetzen ist. (Rheumatismus, Lähmungen, etc.)
- h) *Schwefelbäder*. Kalium sulphurat. 60,0 — 120,0 pro balneo.  
(Blei- und Mercurialintoxication, Rheumatismus, etc.)

- II. i) Kalte Bäder, 10°—16°R (20°C). (Antifebrile, Typhus.)
  - k) Kühle Bäder von 16°—22°R (20°—27°C).
  - l) Laue Bäder von 23°—27°R (28°—34°C).
  - m) Warme Bäder von 28°—32°R (34°—40°C).
  - n) Heisse Bäder über 32°—35°R (40°—45°C).
  - o) Dampfbäder.
  - p) Spiritusbäder.
  - q) Römische Bäder.
- } (Hydrops.)

\* **Baccæ Juniperi**. Im Infus. 15,0—30,0 : 200,0 als Species zu Thee : 1 Esslöffel mit 2 Tassen aufgegossen.

Rp. Inf. fruct. Juniperi 10,0—20,0 : 150,0.  
Liquor. Kali acet.  
Oxymel scill. ââ 15,0.  
MDS. 2stdl. 1 Essl.  
(Diureticum.)

† **Balsamum Copaivæ**. Innerlich zu 20 bis 40 Tropfen mehrmals täglich, rein oder in Capseln, Emulsion, etc.

Rp. Balsam. Copaivæ.  
Extr. Cubeb. ââ 0,6.  
D. In Capseln.  
S. 6—12 pro die.

Rp. Balsam. Copaivæ.  
Tinct. arom. ââ 15,0.  
MDS. 3 × tgl. 20—40 Tropf.

Rp. Balsam. Copaivæ 15,0.  
Gummi mimos. 7,5.  
Aq. com. 120,0.  
Syrup. simpl. 20,0.  
Mf. Emuls.  
S. 2stdl. 1 Essl.

Rp. Balsam. Copaivæ.  
Syrup. balsamic.  
Aq. menth. piper.  
Spirit. vini rectificat. ââ 30,0  
Spirit. nitrico-æther. 4,0.  
MDS. 2—3 × tgl. 1 Essl.

(Potio Choparti.)

(Gonorrhoe, Cystitis, Bronchioblennorrhoe, Hæmoptoe.)

† **Balsamum nucistæ**. Aeusserlich zu Einreibungen.

† **Balsamum peruvianum**. Innerlich in Emulsion; äusserlich zu Einreibungen. 10,0—15,0 jedes Mal.  
(Gegen Scabies und verschiedene Parasiten.)







1. *Phragmites communis* Pers. (Cyperaceae)  
 2. *Scirpus palustris* L. (Cyperaceae)  
 3. *Eleocharis acicularis* (L.) Rostk. Schmidt (Cyperaceae)  
 4. *Sparganium angustifolium* Michx. (Alismaceae)  
 5. *Najas communis* (L.) Rostk. Schmidt (Najas)  
 6. *Chara vulgaris* L. (Characeae)  
 7. *Chara fragilis* L. (Characeae)  
 8. *Chara tritricornis* L. (Characeae)

9. *Chara fragilis* L. (Characeae)  
 10. *Chara tritricornis* L. (Characeae)  
 11. *Chara fragilis* L. (Characeae)  
 12. *Chara tritricornis* L. (Characeae)  
 13. *Chara fragilis* L. (Characeae)  
 14. *Chara tritricornis* L. (Characeae)  
 15. *Chara fragilis* L. (Characeae)  
 16. *Chara tritricornis* L. (Characeae)

17. *Chara fragilis* L. (Characeae)  
 18. *Chara tritricornis* L. (Characeae)  
 19. *Chara fragilis* L. (Characeae)  
 20. *Chara tritricornis* L. (Characeae)  
 21. *Chara fragilis* L. (Characeae)  
 22. *Chara tritricornis* L. (Characeae)  
 23. *Chara fragilis* L. (Characeae)  
 24. *Chara tritricornis* L. (Characeae)

25. *Chara fragilis* L. (Characeae)  
 26. *Chara tritricornis* L. (Characeae)  
 27. *Chara fragilis* L. (Characeae)  
 28. *Chara tritricornis* L. (Characeae)  
 29. *Chara fragilis* L. (Characeae)  
 30. *Chara tritricornis* L. (Characeae)  
 31. *Chara fragilis* L. (Characeae)  
 32. *Chara tritricornis* L. (Characeae)

33. *Chara fragilis* L. (Characeae)  
 34. *Chara tritricornis* L. (Characeae)  
 35. *Chara fragilis* L. (Characeae)  
 36. *Chara tritricornis* L. (Characeae)



*Syrup. balsamicus.*

*Mixtura oleosa balsamica.*

Rp. Balsam. peruv. 5,0—10,0.  
Gummi mimos. 5,0.  
Aq. font. 150,0.  
Syrup. balsam. 20,0.  
Mf. Emuls. 2stdl. 1 Essl.  
(Bronchoblennorrhoe.)

**Belladonnæ herb. et extr.** In Pulvern, Pillen, Tropfen und zu Salben.

ad 0,1 pro dosi!

ad 0,4 pro die!

Rp. Extr. Belladon. 0,3—0,5.  
Aq. amygd. amar. 3,0.  
Aq. com.  
Syrup. Althææ ââ 30,0.  
DS. 2stdl. 1 Theel.  
(Keuchhusten.)

**Atropium sulphur.** In Lösung, Pillen u. zur subc. Injection.

ad 0,001 pro dosi!

ad 0,003 pro die!

Rp. Sol. Atropii sulph.  
0,03—0,06.  
Aq. destill. 10,0.  
DS. Aeusserlich.  
(Zur Erweiterung der Pupille.)

Rp. Atropii sulph. 0,006.  
Extr. Gentian. q. s.  
ut. f. Pill. Nr. X.  
Consp. Sem. Lycop.  
DS. Abends 1—2 (!) Pillen.  
(Schweisse der Phthisiker.)

Rp. Sol. Atropii sulph.  
0,05 : 10,0.  
DS. Zur subcut. Injection.  
Davon 5-12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Theilstriche  
= 0,001—0,0025.  
(Epilepsie, Lyssa, etc.)

\* **Benzinum.** Innerlich 0,2—1,0. Zwei bis dreimal täglich in Lösung oder Capseln; äusserlich zu Einreibungen bei Scabies.

Rp. Benzin, 6,0.  
Mucil. gum. Arab.  
Succi liquirit. ââ 30,0.  
Aq. menth. piper. 120,0.  
MDS. 1—2stdl. 1 Essl.  
(Gegen Trichiniasis.)  
Mosler.

\* Rp. Benzin. 30,0.  
Adip. suill. 50,0.  
Mf. Ungt.  
DS. Zur Einreibung.  
(Scabies.)



**Benzoë.** S. Acid. benzoic.

**Bismuthum hydrico-nitric.** In Pulvern zu 0,2—1,0. Zwei bis dreimal täglich.

Rp. Bismuth. hydr.-nitr. 0,25—1,0.  
Morphii hydrochl. 0,0075.  
Sacch. alb. 0,3.  
Mf. Pulv. d. t. dos. XII.  
S. 3×tgl. 1 Pulv.  
(Ulcus ventricul., Diarrhoe, etc.)

**Borax** (*Natrum biboracicum*). Innerlich in Pulvern zu 1,0—2,0. Aeusserlich zu Pinselungen.

Rp. Boracis 5,0.  
Glycerini 25,0.  
MDS. Zur Pinselung.  
(Aphthen, etc.)

**Bromium.** Es wird ein mit der folgenden Brommischung durchfeuchteter Schwamm in einer Düte vor Nase und Mund gehalten und mehrmals täglich 3—5 Minuten lang inhalirt.

Rp. Bromi.  
Kali bromat. ââ 0,5.  
Aq. destill. 250,0.  
MD. In vitro nigro.  
S. Zur Inhalation.  
1—2stdl. 3—5 Minuten.  
(Croup, Diphtheritis, Asthma.)  
Gottwald, Schuetz.

**Bromkalium.** S. Kalium brom.

**Calami radix.** Innerlich zu 0,5—2,0, mehrmals täglich in Pulvern und im Infus. Aeusserlich als Zusatz zu Bädern : s. d.

*Tinctura calami.* Mehrmals täglich  $\frac{1}{2}$  Theelöffel Amarum. Zusatz zu andern Stomachicis.

Rp. Inf. rad. Calami 5,0—15,0/180,0.  
DS. 2stdl. 1 Essl.

\* **Calcaria chlorata.** Chlorkalk als Verbandwasser 10,0 : 250,0. Zu Räucherungen und zur Desinfection von Kranken-Effecten und Dejectionen.

\* **Camphora.** Zu 0,03—0,3, mehrmals täglich in Pulvern (charta cerata), in Emuls. und in subcut. Injectionen.

*Spiritus camphorat.* Aeusserlich.

*Vinum camphorat.* Verbandmittel (Decubitus).

*Liniment. saponato-camphor.* (Opodeldoc.)



|           |                  |              |
|-----------|------------------|--------------|
| Bol. arb. | <del>IV</del> IV | ) abo nimmte |
| glyr.     | III              |              |
| Ac et     | II               |              |
| gmyr.     |                  |              |

(Phigun pflüßus)

Museus mit. Dampnis für







Rp. Camphoræ trit. 0,03—0,2.  
Sacch. alb. 0,3.  
Mf. Pulv. d. i. chart. cerat. t.  
dos. X.  
S. 1—2stdl. 1 Pulv.

Rp. Camphor. trit.  
† Moschi ââ 0,03—0,2.  
Sacch. alb. 0,3.  
Mf. Pulv. d. i. chart. cerat. t.  
dos. X.  
S. 2stdl. 1 Pulv.

(Excitans.)

† *Cannabis indica* (Haschisch).

*Extract. cannab. ind.* In Pulvern und Pillen.  
ad 0,1 pro dosi!  
ad 0,3 pro die!

*Tinctura cannab. ind.* Innerlich zu 10—20 Tropfen mehrmals.

Rp. Extr. cannab. ind.  
Herb. cannab. ind. pulv.  
ââ 2,0 (!).

F. Pill. Nr. 30.  
Consp. sem. Lycopod.  
DS. 2—5 Pillen (!) auf einmal  
zu nehmen.  
(Jede Pille enthält cr. 0,06  
= 1 gr. Extr. Cannab.)

Rp. Extr. Cannab. ind. 0,03—0,1.  
Sacch. alb. 0,3.  
Mf. Pulv. d. t. dos. VIII.  
Ad chart. cerat.  
S. Mehrmals tgl. 1 Pulv.  
(Narcoticum.)

*Cantharides*. Aeusserlich als Emplastrum.

1) *Emplastrum Cantharid. ordinar. Vesicatoria volantia.*  
(Neuralgie, Acuter Gelenkrheumatismus.)  
Davies'sche Methode.

2) *Emplastrum Cantharidum perpetuum.*  
(Derivans.)

3) *Collodium cantharidatum.*

*Carlsbader-Salz*. S. Natron sulphur.

† *Castoreum sibiricum*. 1,0 kostet ungefähr 10 Frs.; in Pulvern und Pillen zu 0,1—0,6 mehrmals täglich.

† *Castoreum canadense*. 1,0 kostet etwa 7 Sous. Wie d. Vorige.

† *Tinctura Castorei canadense*. Zu 20—50 Tropfen mehrmals täglich.

Rp. Kali bromat. 0,25.  
Castorei canad. 0,06—0,12  
Sacch. alb. 0,3.  
Mf. Pulv. d. t. dos. XII.  
S. 3×tgl. 1 Pulv.

Rp. Tinct. Valerian. æther.  
Tinct. Castorei canad. ââ 7,5  
MDS. 3×tgl. 20—30 Tropfen.

(Krämpfe, Hysterie, etc.)



\* **Catechu.** In Pulvern und Pillen zu 0,5—2,0 mehrmals täglich.

*Tinctura Catechu.* Zu 20—50 Tropfen mehrmals täglich.

Rp. Catechu 0,5—1,0.  
Opium puri 0,01—0,02.  
Sacch. alb. 0,3.  
Mf. Pulv. d. t. dos. XII.  
S. 2—3stdl. 1 Pulv.  
(Chron. Diarrhoe.)

\* **Chamomillæ flores.** Im Infus. 20,0—30,0/200,0; in Species und zu Bädern: s. d.

**Charta nitrata.** In kleinen Streifen zerschnitten, anzuzünden, und die Dämpfe einzuathmen. (Asthma.)

† **Chinæ regiæ cortex.** Im Infus u. Decoct zu 10,0—15,0/180,0.

† *Tinctura Chinæ composita.* Zu 20—60 Tropfen mehrmals täglich, allein oder als Zusatz zu roborirenden Mitteln und Stomachicis.

† *Vinum Chinæ.* Innerlich, Kinder- bis Esslöffelweise.

Rp. Decoct. (oder Inf.) cort. Chinæ reg. 10,0—15,0 : 180,0.  
Acid. sulph. dil. 1,0.  
Syrup. cort. aurant. 20,0.  
DS. 2stdl. 1 Essl.  
(Amarum, Roborans.)

Rp. Tinct. Chin. comp.  
Tinct. aromat. ââ 15,0.  
MDS. 3×tgl.  $\frac{1}{2}$ —1 Theel.

Rp. Tinct. Chinæ comp. 30,0.  
Tinct. nucum vomic. 3,0.  
MDS. 3×tgl. 20—30 Tropfen.

† **Chininum sulphuricum.** In Pulver, Pillen, Oblaten, Capseln, Solution und subcut. Injection bis zu 1,5 pro die. 1,0 kostet ungefähr 1 Fr.

Rp. Chinini sulph. 0,5.  
In Capseln † oder in Pulv. und Oblaten.  
1—3 Stück pro die.  
(Antifebrile, Intermittens, Neuralgien, Acuter Gelenkrheumatismus.)

Rp. Chinini sulph. 0,5—1,0.  
Acid. sulph. dil. 2,0.  
Aq. menth. piperit. 180,0.  
Syrup. Rubi Idæi 20,0.  
MDS. 2stdl. 1 Essl.

Rp. Chinini sulph. 1,0.  
Succi liquirit. q. s.  
ut. f. Pill. Nr. 30.  
DS. 3×tgl. 2—4 Pillen.

† Rp. Chinini muriat. 2,5.  
Acid. muriat. 0,5.  
Aq. destill. 5,0.

DS. Zur subcut. Injection  $\frac{1}{2}$ —1 ganze Spritze.  
(Chinin. muriat. löst sich leichter als Chinin. sulph.)



Chm. Tammie 1,

Calc. port

Recch alb. as 5,

Rhachet.

3 x  $\frac{1}{2}$  1/2 cap 1 len







**Chlorali hydras.** In Solution und subcut. Injection zu 1,0—8,0 pro die.

Rp. Chloral. hydr. 8,0.  
Aq. destill.  
Syrup. cort. aurant.  
ââ 30,0.

MDS. 1—2 Essl.  
(Schlaflosigkeit, Delirium tremens, Ecclampsia part., Lyssa, Strychninvergiftung, etc.)

Rp. Chloral. hydr. 6,0.  
Mucil. Salep 150,0.  
Syrup. Rubi Idæi 30,0.  
MDS. Abends 1—2 Essl. (=0,5—1,0 Chloral).

(Habituelle Schlaflosigkeit, Reizhusten, Ecclampsie der Kinder.)

Rp. Chloral. hydr. 5,0.  
Aq. destill. 10,0.  
DS. Zur subcut. Injection.  
(Mehrere Spritzen zu injiciren,  
1 Spritze=0,5 Chloral.)

**Chloroformium.** Zu Inhalationen 2,0—10,0; äusserlich als local wirkendes Mittel, zu Linimenten.

Rp. Chloroform.  
Olei Hyoscyam. coct.  
ââ 10,0.  
DS. Aeusserlich.  
(Locales Anæstheticum.)

Rp. Chloroform. 10,0.  
Olei Olivar. 30,0—50,0.  
DS. Zum Einreiben.  
(Rheumatismus, Pleuritis, etc.)

\* **Cinæ flores.** Zittwerblüthen. Zu 1,0—5,0, mehrmals täglich.  
(Antihelminthicum.)

**Santonin.** In Pulvern und als Wurmkekuchen: Trochisci santoninici zu 0,05 und 0,025, 3—6 pro Tag.

ad 0,1 pro dosi!  
ad 0,5 pro die!

Rp. Santonini 0,03—0,06.  
Sacch. alb. 0,3.  
Mf. Pulv. d. t. dos. VI.  
S. Morgens u. Abends 1 Plv.  
(Antihelminthicum, bes. bei Kindern.)

Rp. Santonini 0,1—0,3.  
Olei ricini 50,0.  
MDS. Kinderlöffelweise bis zur Wirkung.

† **Coffeinum citricum.** In Pulvern und Pillen zu 0,02—0,06.

Rp. Coffeini citr. 0,03—0,06.  
Sacch. alb. 0,3.  
Mf. Pulv. d. t. dos. XII.  
S. 2—3stdl. 1 Pulv.

Rp. Coffeini citr. 0,6.  
Extr. Gramin. q. s.  
ut. f. Pill. Nr. 10.  
DS. 2stdl. 1 Pille.

(Hemicranie.)

**Colchici semen.**

*Tinctura semin. Colchici.* Zu 20—30 Tropfen, 3—4 Mal am Tage.

ad 2,0 pro dosi!  
ad 6,0 pro die!



*Vinum sem. Colchici.* Ebenso.

Rp. Tinct. semin. Colchici 15,0.  
Tinct. Opii croc. 2,0.  
MDS. 3×tgl. 15 Tropfen.  
(Antirheumaticum.)

**Colocynthis fructus.**

*Fructus Colocynthis præparati.* In Pulvern und Pillen.

ad 0,3 pro dosi!

ad 1,0 pro die!

*Extractum Colocynthis.* In Pillen.

ad 0,06 pro dosi!

ad 0,4 pro die!

Rp. Fruct. Colocynth. præpar.  
0,06—0,1.  
Sacch. alb. 0,3.  
Mf. Pulv. d. t. dos. VIII.  
2stdl. 1 Pulv.

Rp. Extr. Colocynth.  
Extr. Rhei 0,6.  
Rad. et succ. liquirit. q. s.  
ut. f. Pill. Nr. 20.  
DS. Morgens 2—4 Pillen.

\* **Colombo radix.** Zu 0,5—2,0, mehrmals täglich in Pulver,  
Infus oder Decoct.

Rp. Decoct. rad. Colomb. 10,0—15,0 : 160,0.  
Syrup. cort. aurant. 20,0.  
DS. 2stdl. 1 Essl.  
(Antidiarrhoicum.)

**Crotonis oleum.** Innerlich, auf 1 Esslöffel Ricinusöl 1 Tropfen  
Olei crotonis. Aeusserlich als Derivans zu Einreibungen.

ad 0,06 pro dosi!

ad 0,3 pro die!

Rp. Olei crotonis 1,0.  
Glycerini 5,0.  
DS. Zur Einreibung.  
(Hautreiz.)

**Cubebæ fructus.** In Pulvern, Oblaten, Capseln und Pillen.  
Zu 1,0—5,0—10,0 mehrmals täglich, auch in Verbindung  
mit Bals. Copaivæ. S. d.

Rp. Pulv. fruct. Cubebar. 50,0.  
DS. 3—4×tgl. 1/2—1 Theel. in Oblate zu nehmen.  
(Gonorrhoe.)

**Cuprum sulphuricum.** Innerlich in Solution als Brechmittel.  
Aeusserlich in Substanz als Aetzmittel.

ad 0,06 pro dosi!

ad 0,4 pro die!

ad 1,0 pro emetico refracta dosi.



Diphtheritis originis

Hydraz. cyanaz 9.10-10.

*Apr. Meath p.m. i. Tuesday*



Fal. Digit. p  
Nüß. squell  
stib. sulf. aua.  
Ext. Pump. aa 1, 2  
p. N. 50

---



Rp. Sol. Cupri sulphur. 0,6—0,8.

Aq. destill. 40,0.

Syrup. simpl. 20,0.

DS. Alle 5 Minuten 1 Theel., bis Erbrechen erfolgt.  
(Croup, Diphtheritis, Phosphorvergiftung.)

**Digitalis folia.** In Pulver, Pillen, gewöhnlich im Infus.

ad 0,3 pro dosi!

ad 1,0 pro die!

Rp. Inf. fol. digital. 0,6—1,0—1,5 : 180,0.

Syrup. simpl. 20,0.

Oder mit Salzen, wie Kali nitric. 5,0—10,0.

DS. 2stdl. 1 Essl.

(Bei entzündl. Fieber und als Diureticum bei Herzaffection mit gestörter Compensation, Nierenschrumpfung, etc.)

Statt Kali nitricum : Kali aceticum, Kali tartaricum, Tartar. boraxat., Tartar. natronat., etc., und als Zusatz auch Oxy-mel scillit. oder Roob Juniperi 10,0—20,0.

† **Elæosacchara.** Enthalten auf 2,0 Zucker 1 Tropfen äth. Oel.  
(Geschmackscorrigens.)

**Emulsiones :**

*Emulsio communis* 200,0. 2stündlich 1 Esslöffel.

† *Emulsio chinata :*

Rp. Semen papaver. 20,0.

F. c.

Decoct. cort. Chinæ 10,0 : 180,0.

Emulsio.

Syrup. cort. aurant. 20,0.

DS. 2stdl. 1 Essl.

*Emulsio oleosa.* 200,0. 2stündlich 1 Esslöffel.

(Gonorrhoe, Blasenaffection, etc.)

**Ergotin.** S. Secale cornut.

† **Extractum carnis Liebig.**  $\frac{1}{2}$ —1 Theelöffel auf 1 Tasse warmen Wassers.

† **Extractum Malti** (Stuttgarter oder Wilhelmsdörfer). Mehrmals am Tage theelöffelweise, rein oder zu Milch, Bouillon, Bier, Wein, etc. hinzugesetzt.

(Bei Schwächezuständen.)

**Ferrum.**

*Ferrum hydricum in aqua.* Innerlich  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ stündlich 4—6 Esslöffel in heissem Wasser.

(Arsenikvergiftung.)



*Ferrum Hydrogenio reductum.* Zu 0,05—0,2 mehrmals täglich in Pulvern.

(Leichtest verdauliche Eisenpräparat.)

*Ferrum lacticum.* Zu 0,1—0,5 mehrmals täglich in Pulvern und Pillen.

*Liquor ferri sesquichlorati.* Innerlich zu 2—5 Tropfen mehrmals; äusserlich als Inhalationsmittel, Verbandmittel und zu Injectionen (Hæmostaticum).

*Syrupus ferri jodati.* Zu 0,06—0,3 mehrmals täglich in Mixturen.

*Tinctura ferri acetici ætherea.* } Zu 20—40 Tropfen  
*Tinctura ferri pomata.* } 3—4 × täglich.

*Pyrophosphorsaures Eisenwasser.* Täglich 1 Flasche. Eisen- und Stahlwässer. S. Bäder und Brunnen.

Rp. Ferri hydrici in aq. 600,0.  
DS.  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ stdl. 1 Essl. in heissem Wasser.  
(Arsenikvergiftung.)

Rp. Ferri lactici 0,25.  
Sacch. alb. 0,3.  
Mf. Pulv. d. t. dos. VIII.  
DS. 2 × tgl. 1 Pulv.

Rp. Ferri lactici 3,0.  
Succi liquirit. q. s.  
ut. f. Pill. Nr. 50.  
Consp. sem. Lycopod.  
DS. 3 × tgl. 2—4 Pill.  
(Anæmie, Chlorose.)

Rp. Liquor ferri sesquichlor. 15,0.  
DS. 1—2 Tropfen in 1 Essl. Haferschleim. Anfangs  $\frac{1}{4}$ stdl., dann  $\frac{1}{2}$ —2stdl.  
(Stypticum, Darmblutungen bei Typhus, etc.)

Rp. Liquor ferri sesquichlor. 1,0.  
Aq. dest. 100,0.  
DS. Zur Inhalation.  
(Hæmoptoe, Bronchioblenorrhoe.)

Rp. Syrup. ferri jod. 10,0.  
Syrup. simpl. 50,0.  
MDS. 3 × tgl. 1 Theelöffel.  
(Amyloide Nierenerkrankung, etc.)

Rp. Tinct. ferri acet. oder Tinct. ferri pomat.  
Tinct. amar. ââ 15,0.  
MDS. 3 × tgl.  $\frac{1}{2}$ —1 Theelöffel.  
(Anæmie, Chlorose, etc.)

\* *Filicis rad.* Zu 4,0—12,0 in Pulver, Decoct, Latwerge, auch als Zusatz zu Cort. rad. Granati.

† *Extractum filicis.* Zu 0,5—1,0. 2 × täglich in Pillen, und Capseln zu 0,6.

\* Rp. Rad. filicis 4,0.  
d. t. dos. Nr. V.  
D. ad chart.  
S.  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  stdl. 1 Pulv.

Rp. Extr. filicis.  
Pulv. rad. filicis ââ 2,0.  
Mf. Pill. Nr. 20.  
DS. Abends u. Morgens 10 Pillen.  
(Antihelminthicum.)



Tinct. fer. chlor. 4 x 9M 13 in. Pylini. Lvi  
Glycerini ai 5, Subarbori in 1 an.  

---

Ten. oxyd. sacchar. foliul. 10,  
Mata. subsept. 2,  
Syr. sacchar. 20, 3 x i Capillary  
Glycerini 10, Anusam. b. Kroum  

---







\* **Frangulæ cortex.** In Decoct 15,0—30,0 : 200,0 u. als Species. 1 Esslöffel auf 3 Tassen.  
(Drasticum.)

**Gentianæ rad.** Inf. oder Decoct 5,0—20,0 : 200,0. (Amarum.)  
Extract. Gentian. (Pillenconstituens.)

† **Glycerinum.** Innerlich 20,0—300,0 pro die.

*Unguentum Glycerini.*

Rp. Glycerini purissimi 20,0—50,0.  
Aq. font. 1000,0.  
Acid. citrici oder tartarici 5,0.  
DS. Im Laufe des Tages zu trinken.  
(Schultzen gegen Diabetes mell.)

NB. Mit Zusatz von Tinct. Opii simpl. gr. 0,5—1,5, wurden Diabetikern auf unserer Klinik bei allmäliger Steigerung täglich 300,0 Glycerin in der von Schultzen angegebenen Form gereicht.

**Granati radicis cortex.** Im Decoct 30,0—50,0 : 300,0.

Rp. Decoct rad. Granat. 30,0—50,0 : 300,0.  
Extr. Filicis 2,0.  
Syrup. simpl. 20,0.  
DS. In 2 Portionen zu nehmen.  
(Antihelminthicum.)

**Gummi arabicum s. mimosæ.** Zu 2,0—5,0 mehrmals in Pulver, Lösung, Emulsion.

*Pulvis gummosus* (bestehend aus Gummi arab. rad. liquirit. u. Sacchar.).

Rp. Gummi arab.  
Sacchar. ââ 15,0.  
Aq. destill. 170,0.  
MDS. 2stdl. 1 Essl.  
(Mixtura gummosa, Typhus, Diarrhoe, etc.)

**Gutti.** Gummi-resina Gutti. In Pulvern, Pillen, Emulsionen.  
(Drasticum.)

ad 0,3 pro dosi!  
ad 1,0 pro die!

**Hydrargyrum.**

1. *Hydrargyrum depuratum.* Innerlich 1—2 Esslöffel.  
(Ileus.)

*Unguentum hydrargyri cinereum.* 2,0—4,0 täglich (an verschiedenen Stellen) einzureiben.  
(Inunctionscur.)

2) *Hydrargyrum chlorate mite.* Calomel. zu 0,01—0,2 mehrmals täglich in Pulvern und Pillen.



Rp. Calomelan 0,0075—0,01.

Sacchar. alb. 0,3.

Mf. Pulv. d. t. d. XII.

DS. 2—3stdl. 1 Pulv.

(Durchfall und Syphilis  
der Kinder.)

Rp. Calomel 0,03—0,06.

Sacch. alb. 0,3.

Mf. Pulv. d. t. dos. X.

S. 2stdl. 1 Pulv.

(Entzündl. Affection.)

Rp. Calomelan 0,06.

Rad. Jalapæ 0,3.

Sacch. alb. 0,5.

Mf. Pulv. d. t. dos. VI.

2stdl. 1 Pulv.

(Laxans.)

3) *Hydrargyrum bichlorat. corrosiv.* Sublimat in Pillen  
(Dzondi). Zu Waschungen und zu subcutanen Injectionen.

ad 0,03 pro dosi!

ad 0,1 pro die!

Rp. Sol. Hydrargyr. bichlor.

0,1—0,2 : 200,0.

DS. Aeusserlich.

(Sommersprossen.)

Rp. Sol. Hydrargyr. bichlor. 0,25.

Aq. dest. 25,0.

DS. Zur Injection.

$\frac{1}{2}$ —1 Spritze, welche 0,009,  
beinahe  $\frac{1}{6}$  gr. Sublimat ent-  
hält. (Syphilis.)

4) *Hydrargyrum præcipitat. alb.* S. amidato-bichlorat.  
Aeusserlich in Salben.

Rp. Hydrargyr. præcipit. alb. 0,6—1,0.

Axungi porci 15,0.

Mf. Ungt.

DS. Aeusserlich 2 × Erbsen- bis Bohnengross einzureiben.  
(Hautkrankheiten.)

**Hyoscyami folia.** In Pulvern, Pillen und Inf.

ad 0,3 pro dosi!

ad 1,0 pro die!

*Extractum Hyoscyami.* In Pillen, Pulvern, Mixturen, als  
Zusatz zu andern Narcoticis.

ad 0,2 pro dosi!

ad 1,0 pro die!

Rp. Extr. Hyoscyam. 0,25—0,5.

Morphini acet. 0,03.

Aq. amygd. amar. 15,0.

MDS. Zur Zeit 10—20 Tropfen.

(Reizhusten.)

*Olei Hyoscyami coctum.* Aeusserlich zu Einreibungen.

†Rp. Olei Hyoscyam. coct.

Chloroformi 30,0.

MDS. Aeusserlich.

(Rheumatismus, Pleuritis, etc.)



Delaware Lottery & Casino, Inc. v. ...  
...  
...

...  
...  
...  
...  
...

...  
...  
...  
...  
...

(Continued)

Delaware Lottery & Casino, Inc. v. ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...



THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
JANUARY 1921

TO THE HONORABLE  
COMMISSIONER OF THE  
LAND OFFICE  
CHICAGO, ILL.

RE: THE LANDS  
IN THE  
TOWNSHIP OF  
CHICAGO, ILL.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
JANUARY 1921

TO THE HONORABLE  
COMMISSIONER OF THE  
LAND OFFICE  
CHICAGO, ILL.

RE: THE LANDS  
IN THE  
TOWNSHIP OF  
CHICAGO, ILL.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
JANUARY 1921

TO THE HONORABLE  
COMMISSIONER OF THE  
LAND OFFICE  
CHICAGO, ILL.

RE: THE LANDS  
IN THE  
TOWNSHIP OF  
CHICAGO, ILL.



**Jalapæ tubera s. rad.** In Pulv. u. Pillen zu 0,3—2,0, ebenso *Sapo jalapinus* gew. in Verbindung mit Calomel, Aloe und Rheum.

Rp. Rad. Jalapæ 0,2.  
Calomel 0,06.  
Sacch. alb. 0,3.  
Mf. Pulv. d. t. dos. X.  
2stdl. 1 Pulv.

† Rp. Extr. Aloes.  
Extr. Rhei comp.  
Sapon. jalapin. ââ 2,0.  
Succi liquirit. q. s.  
ut. f. Pill. Nr. 20.  
DS. Morgens u. Abds. 2—3 Pill.  
(Abführmittel.)

**Jodum.** Aeusserlich als Lugol'sche Lösung.

Rp. Jodi puri 1,2.  
Kali jod. 1,8.  
Aq. destill. 30,0.  
MDS. Aeusserlich zu Injectionen.  
(Hydrocele, Hydrovarien, etc.) [Lugol'sche Lösung.]

*Tinctura Jodi.* Innerlich (sehr selten) zu 2—4 Tropfen; äusserlich zu Bepinselungen und subcut. (parenchymatösen) Injectionen.

ad 0,3 pro dosi!  
ad 1,2 pro die!

Rp. Tinct. Jodi. 15,0.  
DS. Zur subcut. Injection.  
 $\frac{1}{2}$ —1 ganze Spritze.  
(Struma, Ischias, etc.)

Rp. Tinct. Jodi.  
Tinct. Gallar. ââ 10,0.  
MDS. Aeusserlich zu Bepinselungen.

† *Kalium jodatum.* Zu 0,1—0,5 mehrmals täglich in Solution, auch zur Inhalation.

Rp. Sol. Kali jod.  
3,0—8,0 : 200,0.  
DS. 3 × tgl. 1 Essl.  
(Lues, Rheumatismus,  
Lähmungen, etc.)

Rp. Sol. Kali jod. 0,5—1,0 : 200,0.  
DS. Zur Inhalation.  
(Asthma.)

*Unguentum Kali jodati.* Aeusserlich zur Beförderung der Resorption.

\* *Ipecacuanhæ radix.* Zu 0,02—0,06 mehrmals tgl. in Pulvern und Infus als Expectorans; in stärkerer Dosis als Emeticum.

*Syrupus Ipecacuanhæ.* Als Zusatz zu expectorirenden Mixturen.

Rp. Inf. rad. Ipecac. 0,6 : 180,0  
(Tinct. Opii simpl. 1,0.)  
Syrup simpl. 20,0.  
DS. 2stdl. 1 Essl.  
(Nauseosum, Expectorans,  
Bronchialkatarrh.)

Rp. Pulv. rad. Ipecac. 1,0.  
Syrup. Althææ 30,0.  
MDS. Von 10 zu 10 Minuten  
1 Theelöffel.  
(Brechmittel für Kinder.)

Ipecacuanha mit Opium  
(siehe Opium).

Ipecacuanha mit Tartarus stibiatus  
(s. Antimon.)



\* **Juniperi baccæ s. fructus.** Im Infus und als Species zum Thee, 1 Esslöffel auf 2 Tassen.

*Extractum s. Succus s. Roob Juniperi.* Als Zusatz zu diuretischen Mixturen 10,0—20,0 : 200,0.

Rp. Inf. fruct. Juniperi 10,0—20,0 : 180,0.

Liquor Kali acet.

Oxymel scill. ââ 15,0.

DS. 2stdl. 1 Essl.

(Diureticum.)

**Kali aceticum.** Zu 0,5—4,0 in Solution, gew. als

*Liquor Kali acet.*, zu 10,0—30,0 : 200,0.

(Diureticum und Diaphoret.)

**Kali bitartaricum depur. s. Cremor tartari s. Tartar depurat.** Innerlich zu 0,5—2,0, mehrmals täglich in Pulvern und als Zusatz zu abführenden und diuretischen Mixturen, Thee's, etc., etc.

Rp. Tartar. dep. 30,0.

Elæosacch. menth. pip. 10,0.

Mf. Pulv.

D. in scat.

S. 3—4 × täglich 1 Theelöffel.

(Leichtes Diureticum und Diaphoreticum.)

**Kali carbonicum pur.** Innerlich zu Saturationen.

\* Rp. Kali carbon. pur. 5,0  
Aceti.

Aq. font. ââ 90,0.

Syrup. simpl. 20,0.

DS. 2stdl. 1 Essl.

(Saturatio com.)

† Saturatio citri e citro  
uno 180,0.

Syrup. cort. aurant. 20,0.

DS. 2stdl. 1 Essl.

(Icterus gastro-duod., Catarrh. gastr., Rheumat. art. acut., etc.)

\* **Kali chloricum.** Innerlich zu 0,1—0,5 mehrmals täglich in Solution; äusserlich 10,0 : 200,0 zum Gurgeln, und in Substanz bei Caries der Zähne. (E. Neumann.)

Rp. Sol. Kali chlorici  
5,0—10,0 : 200,0.

DS Zum Gurgeln.  
(Angina, Stomatitis.)

Rp. Sol. Kali chlorici.  
2,0—4,0 : 150,0.

Syrup. cort. aurant. 30,0.

DS. 1—2stdl. 1 Essl.

(Aphthen, Angina und leichte Diphtheritis.)

\* **Kali hypermanganicum cryst.** Aeusserlich in Solution von 1,0—2,0 : 200,0.

Rp. Sol. Kali hypermang. 1,0—2,0 : 200,0.

DS. Aeusserlich.

(Als Desinficiens, Gurgelwasser, etc.)



Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header, including the word "Memorandum".

Handwritten text in the middle section of the page, appearing to be a list or series of notes.

Handwritten text in the lower middle section of the page, continuing the list or notes.

Handwritten text in the lower section of the page, possibly a conclusion or final notes.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or date.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY



\* **Kali nitricum.** Salpeter. Innerlich, in Pulvern und Solution zu 0,5—1,5, mehrmals täglich.

Rp. Kali nitric. 2,0.  
Tartar. dep. 6,0,  
Sacchar. 12,0,  
Mf. Pulv. d. in scat.  
S. Mehrmals tgl. 1—2 Thee-  
löffel in Wasser gelöst.  
(Pulvis temperans.)

Rp. Sol. Kali nitric.  
8,0—10,0 : 180,0.  
Syrup. simpl. 20,0.  
DS. 2stdl. 1 Essl.  
(Antifebrile u. Diureticum.)

**Kalium bromatum.** In Solution und Pulvern zu 0,3—1,0, mehrmals täglich.

Rp. Sol. Kali bromat.  
4,0—6,0—8,0 : 200,0.  
DS. 3 × tgl. 1 Essl.

Rp. Kali bromat. 0,25—0,3.  
Sacch. alb. 0,3.  
Mf. Pulv. d. t. dos. X.  
S. 3 × tgl. 1 Pulv.

† Rp. Kali bromat. 0,25.  
Castor. canad. 0,06—0,12.  
Sacch. alb. 0,3.  
Mf. Pulv. d. ad. chart. cerat. t. dos. VIII.  
3 × tgl. 1 Pulver.  
(Epilepsie, Chorea, Nervöse Schlaflosigkeit.)

**Kalium sulphuratum.** Zu Bädern, 60,0—200,0.  
(Blei- und Mercurialintoxication, Rheumatismus, etc.)

† **Kamala.** Pulver zu 5,0—15,0, auf einem Male.

Rp. Kamala 10,0—15,0, mit Wasser, Wein oder Bouillon in  
2 Portionen zu nehmen.  
(Bandwurmmittel, welches zugleich drastisch wirkt.)

**Kreosot.** Innerlich in Solution.

ad 0,05 pro dosi!  
ad 0,2 pro die!

Rp. Kreosoti 0,05.  
Spiriti vini rectificat. 0,2  
Decoct. rad. Salep. 120,0  
MDS. 2stdl.  $\frac{1}{2}$ —1 Theel.  
(Brechdurchfall d. Kinder.)

Rp. Kreosoti 0,2.  
Aq. menth. pip. 180,0.  
Mucil. Salep. 20,0.  
MDS. 2stdl. 1 Essl.  
(Gegen Erbrechen.)

† **Kumys.** 1—2 Flaschen täglich.

(Nutriens bei Phthisis, etc.)

† **Kusso flores.** Zu 20,0—30,0, am besten mit Rothwein oder als Electuarium zu nehmen. 30,0 kosten beinahe 1 Fr.

Rp. Flores Kusso.  
Mel despumat. ââ 20,0.  
ut. f. Electuar.  
DS. In 2 Portionen zu nehmen.  
(Antihelminthicum.)



\* **Lichen islandicus.** Zu 15,0—30,0 pro die im Decoct.

Lichen island.,  
Stipit. dulcam.,  
Herb. card. bened.,  
Herb. centaur. minor.,  
Rad. Althææ,  
Rad. Gramin.,  
Rad. liquirit.,

in verschiedenen Combinationen zu expectorirenden und stärkenden Thee's, 1 Esslöffel auf 2 Tassen, Morgens und Abends 1 Tasse.

Rp. Lichen island.  
Stipit. Dulcam. ââ 30,0.  
Herb. cardui bened.  
Herb. centaur. minor. ââ 20,0.  
Mf. Spec. divide in part. X.  
DS. Tgl. 1 Päckchen zu verbrauchen.  
(Auf 1 Päckchen 3 Tassen Wasser aufgiessen, auf 2 zusammenkochen lassen und dann Morgens und Abends 1 Tasse trinken.) (Phthisis pulm.)

\* **Linimentum saponato-ammoniacatum.** S. Ammoniak.

**Linimentum saponato-camphorat.** (Opodeldoc.)

† **Linimentum volatile.** S. Ammoniak.

**Lini olei.** In Verbindung mit Aqua calcis. S. d.  
(Bei Verbrennungen und Eczem.)

**Liquiritiæ rad.** Im Infus, Pulvern, Species, als Zusatz zu expectorirenden Mitteln.

*Extractum (Succus) liquirit.* Als Constituens für Pillen.

*Syrupus liquiriticæ.* Als Zusatz.

*Pulvis liquirit. comp. (Curella).*  $\frac{1}{2}$ —1 Theel. mehrmals.  
(Leichtes Abführmittel für Hæmorrhoidarier, etc.)

† **Lithium carbonicum.** Zu 0,05—0,3, mehrmals täglich in Pulvern, Pillen und zur Inhalation.

*Aqua lithii carbonici* (0,15 : 100,0). (Gicht.)

Rp. Sol. lithii carbon. 1,0—4,0 : 200,0.  
DS. Zur Inhalation.  
(Croup und Diphtheritis.)

**Lupulinum.** Zu 0,3—0,6 zweimal täglich, in Pulverform.

Rp. Lupulini.  
Sacchar. alb. ââ 0,5.  
Mf. Pulv. d. t. dos. IV.  
DS. Abends 1 Pulv.







Morf. ac. 0,05

Rad. iper. 0,2

Stib. sulf. aur. 0,25

Succo ac.

Rad. ditt. aa 1,5 frid ℞ xxv et aq.



**Lycopodium.** Aeusserlich als Streupulver.

(Nässendes Eczem, Intertrigo, etc.)

\* **Magnesia.**

*Magnesia carbon. u. usta* (sehr leichtes Pulver). Theelöffelweise.

(Gegen Vergiftung durch Mineralsäuren und Arsenik.)

*Pulvis magnesicæ cum Rheo.* Kinderpulver, 3—4 × täglich 1 Messerspitze voll mit Wasser.

(Bei Gastricismus der Kinder.)

NB. Nicht über 10,0 zu verschreiben.

**Manna.** Als

\* *Syrupus Sennæ cum Manna* (Mannasyrup). Theelöffelweise.  
(Abführmittel für Kinder.)

**Mixtura gummosa.** S. Gummi arab.

**Mixtura solvens.** S. Ammoniak.

† **Morphinum hydrochloricum u. aceticum.** Als Pulver, Solution, Tropfen, Syrup und in subcut. Injection.

ad 0,03 pro dosi!

ad 0,12 pro die!

*Syrupus Morphini.* (0,03 Morphii acet. auf 60,0 Syrup. zu 1—3 Theelöffel.)

Rp. Morphii hydrochl. 0,01.

Sacch. alb. 0,3.

Mf. Pulv. d. t. dos. VI.

DS. Abends 1 Pulv.

Rp. Sol. Morphii hydrochl. 0,15

Aq. laurocerasi 15,0.

DS. 3 × täglich 15 Tropfen (20

Tropfen enthalten 0,01

Morphinum).

(Narcoticum.)

Rp. Sol. Morphii hydrochl.

0,06—0,12.

Syrup. Althææ 60,0.

MDS. 3 × tgl. 1 Theel.

Rp. Sol. Morphii hydrochl. 1,0.

Glycerini pur. 5,0.

Aq. destill. 25,0.

DS. Zur subcut. Injection.

(Die ganze Spritze enthält

0,03 Morphinum.)

† **Moschus.** In Pulvern (ad chart. cerat.) zu 0,1—0,5 mehrmals täglich. (1,0 kostet 10 Fr.!)

† *Tinctura Moschi.* Zu 10—30 Tropfen 2—3stündlich, und in subcutaner Injection  $\frac{1}{2}$ —2 volle Spritzen.

† Rp. Moschii 0,06—0,3.

Sacch. alb. 0,3.

Mf. Pulv. d. t. dos. VI.

d. ad chart. cer.

S. 2—3stdl. 1 Pulv.

† Rp. Moschi.

Camphoræ trit. ââ 0,03—01.

Sacch. alb. 0,3.

Mf. Pulv. d. ad chart. cer. t. dos.

VIII.

S. 2stdl. 1 Pulv.

(Excitans.)



† Rp. Moschi 0,12—0,2.  
Syrup. Althææ oder Croci oder Morphii 60,0.  
MDS. 2—3stdl. 1 Theel.  
(Keuchhusten.)

\* **Natrum chloratum.** Kochsalz. Innerlich 1—2 Theelöffel (bei Hæmoptoe und Vergiftungen mit Argent. nitr.). Aeusserlich zu Inhalationen in  $\frac{1}{2}$ —2 procentiger Lösung. Ferner zu Klystieren, 1 Thee- bis 2 Esslöffel, und zu Bädern, 1—5 Kilogr.

**Natrum biboracicum.** S. Borax.

\* **Natrum bicarbonicum.** In Pulvern und Solution zu 0,5—1,5 mehrmals täglich.

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Rp. Natri bicarb. 20,0.                  | Rp. Sol. natri bicarbon. |
| Elæosacc. menth. pip. 10,0               | 5,0—10,0 : 180,0.        |
| Mf. Pulv. d. ad scat.                    | Tinct. aromat. 10,0.     |
| S. 3 × tgl. 1 Messerspitze—1 Theelöffel. | DS. 2stdl. 1 Essl.       |

(Catarrh. gastr., Rheumat. art., Diabet., etc.)

**Natrum nitricum.** Zu 0,5—1,0, mehrmals in Pulvern und Solution.

Rp. Sol. natri nitrici 5,0—10,0 : 200,0.  
DS. 2stdl. 1 Essl.  
(Antifebr., Rheumat. art. acut., etc.)

\* **Natrum sulphuricum.** Glaubersalz. Zu 1,0—2,0 mehrmals täglich in Pulver, Lösung, auch als

\* *Sal Thermanum Carolinense artificiale* (künstliches Carlsbader Salz) :

Rp. Natri sulphur. 90,0.  
— bicarb. 6,0.  
— chlorat. 3,0.  
Mf. Pulv.  
S. Morgens 1—2 Theel. auf 1 Tasse warmen Wassers.

† *Natürliches Carlsbader Salz.*

† *Natürliches Carlsbader Wasser.*

(Chronischer Magen- und Brustkatarrh, ulcus ventriculi, Unterleibsstockungen, etc.)

**Nestlé'sches Kindermehl.** 2 Kinderlöffel auf 6 Esslöffel Wasser, mehrmals täglich.

(Als Ersatz der Muttermilch.)

**Nux vomica s. Semen Strychni.** S. Strychnium.



Mindwiffen:

Brauer.

Acid. Glac.

Thymol. aa 2, 5

Scammon 9, 05

sol. to Rect. 250. adun.

Spirit 100

ol Thymol XV filter

---



1871-72

1871-72

1871-72

1871-72

1871-72

1871-72

1871-72

1871-72

1871-72

1871-72

1871-72

1871-72

1871-72

1871-72

1871-72

1871-72

1871-72

1871-72

1871-72

1871-72

1871-72

1871-72

1871-72

1871-72

1871-72

1871-72

1871-72

1871-72

1871-72

1871-72

1871-72

1871-72



**Oleum jecoris aselli.** Leberthran. Mit 2 Theelöffeln täglich anzufangen und allmählig bis 3 Esslöffel zu steigen.

(Scrophulose, Phthise, Rachitis. Contraindicirt bei Fieber und gastrischen Störungen.)

**Ononidis radix.** S. Species diureticæ.

**Opium.** In Pulvern und Pillen.

ad 0,15 pro dosi!

ad 0,5 pro die!

*Extractum Opii.* In derselben Form wie das vorige, aber mehr als noch einmal so theuer.

ad 0,1 pro dosi!

ad 0,4 pro die!

Rp. Opii puri 0,01—0,02—0,03  
Sacch. alb. 0,3.

Mf. Pulv. d. t. dos. XII.

S. 2—3stdl. 1 Pulv.

Rp. Opii puri 0,01—0,02.  
Plumb. acet. 0,02—0,03.  
Sacch. alb. 0,3.

Mf. Pulv. d. t. dos. XII.

S. 2stdl. 1 Pulv.

Rp. Opii pulv. 0,3.  
Succi liquirit. dep. q. s.  
ut. f. pill. Nr. 30.

Consp. s. Lycopodi.

DS. 3 × tgl. 2 Pillen.

(Jede Pille=0,01 Opium.)

Rp. Stibii sulphur. aurat. 0,06.

Opii puri 0,01.

Sacch. alb. 0,3.

Mf. Pulv. d. t. dos. X.

S. 2—3stdl. 1 Pulv.

(Catarrh. bronch., Emphysem, Asthma, etc.)

Rp. Opii pulv.

Rad. Ipecac. ââ 0,03.

Sacch. alb. 0,3.

Mf. Pulv. d. t. dos. VIII.

S. 2—3stdl. 1 Pulv.

(Statt Pulvis Doweri.)

*Tinctura opii simplex s. thebaica.* Zu 5—20 Tropfen, mehrmals. (1 Tropfen dieser Tinctur enthält 0,005 Opium, mithin 12 Tropfen = 0,06 Opium.)

ad 1,5 pro dosi!

ad 5,0 pro die!

† *Tinctura opii crocata.* Dieselbe Form und Dosis wie das vorige, aber theurer.

\* *Tinctura opii benzoica.* Zu 20—50 Tropfen, mehrmals allein oder als Zusatz zu expectorirenden Mixturen. (200 Theile enthalten 1 Theil Opium.)

Rp. Tinct. opii simpl. 10,0.  
DS. 3 × tgl. 10—15 Tropfen.

Rp. Tinct. opii benz. 30,0.  
DS. Mehrmals 20—40 Tropfen.

Rp. Tinct. opii crocat.

Tinct. Valer. æth.

Tinct. aromat. ââ 5,0.

MDS. Mehrmals 15—20 Tropfen.

Rp. Tinct. opii benzoic. 10,0.

Syrup. Althææ 60,0.

MDS. 2stdl. 1 Theel.

**Opodeldoc.** S. Camphora.



† **Pepsinum.** Als

† *Vinum pepsini.* Thee-, Esslöffelweise nach der Mahlzeit.  
(200,0 kosten 2 1/2 Frs.) (Verdauungsschwäche.)

**Petroselini semen.** S. Aqua petrosel.

\* **Pix liquida.** Aeusserlich zu Einreibungen.

Rp. Picis liquid.  
Sapon. virid.  
Spirit. vini ââ 15,0.  
Mf. linim.  
DS. Aeusserlich.  
(Hautkrankheiten.)

\* **Plumbum aceticum.** In Pulvern.

ad 0,06 pro dosi!  
ad 0,4 pro die!

Rp. Plumb. acet. 0,03—0,06.  
Sacch. alb. 0,3.  
Mf. Pulv. d. t. dos. XII.  
S. 1—2stdl. 1 Pulv.  
(Hæmoptoe.)

Rp. Plumb. acet. 0,03—0,06.  
Opii puri 0,01—0,03.  
Sacch. alb. 0,3.  
Mf. Pulv. d. t. dos. VIII.  
S. 2—3stdl. 1 Pulv.  
(Diarrhoe.)

*Plumbum tannicum pulliforme*, s. Cataplasma ad decubitu-  
tum. Aeusserlich.

Aqua plumbi.  
Aqua Goulardi.  
Unguentum plumbi. } Aeusserlich.

**Potio Choparti.** S. Balsamum Copaivæ.

**Pulvis ærophorus.** Zu 1—2 Theelöffel auf 1 Glas Wasser.

**Pulvis ærophorus Anglicus :**

Natri bicarb. 2,0.  
Acid. tartar. 1,5.

† **Pulvis ærophorus laxans.** (Seydlitz Powder.)

Tartar. natron. pulv. 7,5.  
Natri bicarbon. 2,5  
und  
Acid. tartar. 2,0.

**Pulvis Curellæ.** S. Senna.

**Pulvis Doweri.** S. Opium.

**Pulvis Magnesiae c. Rheo.** S. Magnesia.

**Pulvis Plummeri.** S. Antimon.

**Pulvis temperans.** S. Kali nitricum.



Pul. Dentip. Burro  
Cours. ppt. 5,  
Rad Invaranens. 10, mife  
Cant. lign. pulv. 20.

---

Chelone  
Ext. Guebre. loyud 10  
I vepi 20,  
3i. Ynalt

---

Pilicarp miter 0,02 ip. capilap  
Pepus. 0,5 mit Intuin.  
Ac. hydrom. 0,15 Drpff. d. Thut  
I vepi 240 80

---

Pilicarp. hydrom. 0,1  
I vepi 2, gagan. acut. Hemeralopie  
fuit Pyrofo. sale miffpiffen  
Hyl. hul. kl. An. Nf. 1880  
pag 633.

---



July 1894

Received of Mr. J. H. ...  
the sum of ...

for ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...



\* *Ratanhæ radix*. In Pulvern zu 0,5—1,5 mehrmals täglich und im Decoct.

† *Extractum Ratanhæ*. Ungefähr dieselbe Dosis wie das Vorige.

Rp. Decoct. rad. Ratanhæ 10,0—15,0 : 180,0.

Syrup. cort. aurant. 20,0.

DS. 2stdl. 1 Essl.

(Diarrhoe.)

† *Rhei rad.* Zu 0,1—0,5 mehrmals täglich in Pulver, Pillen und Infus. In Stücken (besonders poliklinisch), 10,0 kosten circa 1 Fr.

† *Extractum Rhei*.

† *Extractum Rhei comp.*

} in Pillenform.

\* *Tinctura rhei aquosa*.

† *Tinctura rhei vinosa*.

} 2—3 × täglich 1 Theelöffel.

(Stomachium.)

\* *Pulvis Magnesiae cum Rheo*. Messerspitzweise 3—4 × tgl.  
*Syrup. Rhei cum Manna*. Theelöffelweise.

(Mildes Abführmittel für Kinder.)

† Rp. Inf. rad. Rhei

6,0—8,0 : 180,0.

Kali tartar. oder

Natr. bicarb. 5,0—10,0.

Elæosacch. menth. pip.

10,0—15,0.

DS. 2stdl. 1 Essl.

Rp. Pulv. rad. Rhei 0,25.

Natri bicarb. 0,3,

Sacch. alb. 0,5.

Mf. Pulv. d. t. dos. VI.

DS. 3 × tgl. 1 Pulv.

(Catarrh. gastr., Icterus, etc.)

† Rp. Extr. Rhei comp.

Extr. Aloes.

Sapon. jalap. ââ 2,0.

Succi liquirit. q. s.

ut. f. Pill. Nr. 20.

DS. Morgens und Abends 2—3 Pillen.

(Abführpillen.)

\* *Ricini oleum*. Mehrmals täglich 1 Esslöffel mit Rothwein, Bouillon oder Kaffee.

(Diarrhoe, Obstipation, Dysenterie.)

*Salep tubera s. rad.* Als

*Mucilago Salep*. Thee- bis Esslöffelweise (als einhüllender Zusatz zu andern Mixturen).

\* *Salviæ folia*. Im Infus 10,0—20,0 : 200,0 und zu Species.

Rp. Inf. fol. Salviæ 10,0—20,0 : 200,0.

DS. 2stdl. 1 Essl.

(Gegen Schweiss der Phthisiker; auch äusserlich zum Gurgeln bei Angina, etc.)



\* **Sambuci flores.** Zu Species und im Infus (1 Esslöffel auf 3 Tassen).  
(Diaphoreticum.)

**Santonin.** S. Cinæ flores.

† **Sassaparillæ radix.** Als Zittmann'sches Decoct. 15,0—60,0 : 300,0.

**Saturatio communis.** }  
**Saturatio citrica.** } S. Kali carbon.

**Saturatio diuretica.** S. Scillæ radix.

**Scillæ radix s. bulbus.** Im Infus 2,0—5,0 : 200,0.

*Acetum scilliticum.* Als Zusatz zu diuretischen Mixturen und Saturationen.

*Oxymel scilliticum.* Zu 10,0—20,0 diuretischen und brechenenerregenden Mitteln hinzuzusetzen.

Rp. Inf. rad. Scillæ  
2,0—6,0 : 180,0.

Syrup. simpl. 20,0.  
DS. 2stdl. 1 Essl.

Rp. Saturat. acet. scillit.  
20,0—40,0 : 180,0.

Roob Juniperi 20,0.  
DS. 2stdl. 1 Essl.

(Diureticum.)

\* **Secale cornutum.** In Pulvern zu 0,3—0,6 mehrmals täglich und im Infus 5,0—10,0 : 200,0.

† *Ergotinum s. extractum secal. corn. aquos.* In subcut. Injection zu 0,1—0,2.

Rp. Secale cornut. 0,2—0,6.  
Sacch. alb. 0,3.

Mf. Pulv. d. t. dos. VIII.  
DS. Mehrmals 1 Pulv.

Rp. Inf. secal. cornut.  
5,0—7,5 : 180,0.

DS. 2stdl. 1 Essl.

(Blasenblutung, nächtliche Schweisse, etc.)

Rp. Ergotini 2,5.

Spirit. vini rect. (oder Aq. destill.).

Glycerini ââ 7,5.

DS. Zur subcut. Injection. (Die volle Spritze enthält 0,12 Ergotin.)

(Blutungen, Aneurysmen, etc.)

**Senegæ radix.** Im Inf. oder Decoct. 5,0—10,0 : 200,0.

\* *Syrupus Senegæ.* Als Zusatz zu andern expectorirenden Mitteln.

Rp. Inf. rad. Senegæ 5,0—10,0 : 180,0.

(Liq. ammon. anisat. oder

Tinct. opii. benz. 2,0—5,0.)

Syrup. Althææ, oder

— Liquirit. oder

— Senegæ 20,0.

DS. 2stdl. 1 Essl.

(Expectorans.)







1. The first part of the report is devoted to a general survey of the situation in the country.

2. The second part contains a detailed account of the work done during the year.

3. The third part is a summary of the results of the work, and a comparison with the results of previous years.

4. The fourth part contains a list of the names of the persons who have taken part in the work.

5. The fifth part is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices.

6. The sixth part is a list of the names of the persons who have been elected to the various offices.

7. The seventh part is a list of the names of the persons who have been elected to the various offices.

8. The eighth part is a list of the names of the persons who have been elected to the various offices.

9. The ninth part is a list of the names of the persons who have been elected to the various offices.

10. The tenth part is a list of the names of the persons who have been elected to the various offices.

11. The eleventh part is a list of the names of the persons who have been elected to the various offices.

12. The twelfth part is a list of the names of the persons who have been elected to the various offices.

13. The thirteenth part is a list of the names of the persons who have been elected to the various offices.

14. The fourteenth part is a list of the names of the persons who have been elected to the various offices.

15. The fifteenth part is a list of the names of the persons who have been elected to the various offices.

16. The sixteenth part is a list of the names of the persons who have been elected to the various offices.



† *Sennæ folia*. Im Infus 5,0—15,0 : 200,0.

\* Als Hausmittel,  $\frac{1}{2}$ —1 Esslöffel auf 1 Tasse Thee.

† *Infusum Sennæ compositum*. Wiener Trank. Mehrmals täglich 1 Essl.

\* *Pulvis liquiritiæ comp.* Morgens und Abends 1 Theelöffel.

† *Species laxantes St. Germain*. Im Infus, 1—2 Theelöffel auf 1 Tasse.  
(Abführmittel.)

*Species ad Decoctum Lignorum*. Zu 20,0—60,0 täglich in Abkochung zu verbrauchen. — 2 Esslöffel *Species ad Decoct. lignor.* und 1 Theelöffel *Folia Sennæ* werden mit 6 Tassen Wasser auf 4 Tassen eingekocht und diese im Laufe des Tages getrunken.

(Hautkrankheiten, Syphilis, etc.)

*Species diureticæ* :

Rad. Levisti.

Ononid. spin.

Liquir. flor.

Stœchad. citr.

Fruct. Juniperi ââ.

DS. 1 Essl. auf 2 Tassen.

\* *Species pectorales* (*Species ad infus. pectorale*). Brustthee, 1 Esslöffel auf 2—3 Tassen.

† *Spiritus angelicæ comp.*

*Spiritus camphoratus*.

† *Spiritus formicarum*.

† *Spiritus sinapis*.

*Spiritus vini*.

In den verschiedensten Combinationen zu Einreibungen.

(Lähmungen, Rheumatismus, Anæsthesie, etc.)

*Stibio-Kali tartaricum*. S. Antimon.

*Strychni semen sive Nux vomica*.

*Strychnium nitricum*. In Pillen und subcut. Injection.

ad 0,01 pro dosi!

ad 0,03 pro die!

Rp. *Strychnii nitr.* 0,06.

Aq. fervid q. s. ad. solut.

Extr. Liquirit.

Pulv. rad. Liquirit ââ 2,0.

F. Pill. Nr. 30.

Consp. sem. Lycopod.

DS. Mit 2 Pillen tgl. zu beginnen und dann allmählig bis auf 6, 8 und 10 zu steigen.

Rp. *Strychnii nitr.* 1,0.

Aq. destill. 10,0.

DS. Zur subcut. Injection.

Davon  $7\frac{1}{2}$ —15—30 Theilstri-  
che = 0,0015—0,003—0,006  
= $\frac{1}{40}$ — $\frac{1}{20}$ — $\frac{1}{10}$  gr.

Die ganze Spritze enthält 0,01  
*Strychnin*.

(Hysterische Paralysen, Kehlkopfparalysen,  
Periphere- und Rückenmarksparalysen.)



*Extractum semin. Strychni aquosum.*

ad 0,2 pro dosi!

ad 0,6 pro die!

*Extractum semin. Strychni spirituosum.* In Pulvern und Pillen.

ad 0,05 pro dosi!

ad 0,15 pro die!

*Tinctura Strychni s. nuc. vomic.* Mehrmals täglich, zu 3—5—10 Tropfen.

ad 0,5 pro dosi!

ad 1,5 pro die!

Rp. Tinct. sem. Strychni.  
Tinct. opii crocat.  
Tinct. Chin.comp. 5,0  
MDS. Mehrmals tgl. 10—15  
Tropfen.

(Diarrhoe.)

Tinctura Chinæ comp. 30,0.  
oder (Tinctura rhei vinosa, oder  
Tinct. Valerian. 30,0.)  
Tinct. nuc. vomic. 3,0.

MDS. 3 × tgl. 1/2 Theel.  
(Stomachicum.)

\* *Styrax liquidus.* Als Liniment.

Rp. Styracis liquid. 30,0.

Olei olivar. 10,0.

MDS. Zu zweimaliger Einreibung.

(Scabies und Morpionen.)

*Sulphur aurat.* S. Antimon.

*Syrupi.* S. bei den betreff. Mitteln.

*Tannin.* S. Acid. tannicum.

*Terebinthinæ oleum.* Innerlich, in Tropfen 5—20 mehrmals täglich; in Capseln zu 0,6, in Mixturen (mit Aether); äusserlich zu Einreibungen und Inhalationen.

Rp. Olei terebinth.  
Aether 7,5.  
MDS. 3 × tgl. 5 Tropfen.  
(Ischias.)

Rp. Olei terebinthin.  
Spirit. vini rectific. 6,0.  
Aetheris 1,0.  
MDS. Stdl. 20—50 Tropfen in Hafer- oder Salepschleim.  
(Phosphorvergiftung.)

Rp. Olei terebinth.  
1,0—3,0 : 200,0.  
DS. Zur Inhalation.  
(Emphysem. pulm., Bronchitis putrida, Gangræna pulm.) (Skoda.)

Rp. Olei terebinthin.  
in Capseln zu 0,6.  
Mehrmals tgl.  
(Lungenabscess, Gangræna pulm., Bronchiorrhoe, etc.)

Rp. Olei terebinth. 50,0.  
DS. Aeusserlich.  
(Erysipelas.)



Ierelint Chios. 5,

sub. Aet 14

sub. sul. Fragar. 12,

sub. 30,

Re. Sulph. 2,5

o. ad 480,

3x 1/2 2/3

hi carcerum Mactag

o. sul. R. Aet. 1/2

1880. N. 43.



For the (C) 1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900



**Tartarus stibiatus.** S. Antimon.

\* **Tiliæ flores.** Lindenblüthen zum Thee; 1 Esslöffel auf 3 Tassen.  
(Diaphoreticum.)

**Unguentum diachylon Hebræ :**

Rp. Emplastr. plumbi spl.

Olei lini ââ 10,0.

Mf. Unguent.

(Hebra'sche Salbe gegen Eczem, Lichen, Schweissfüsse.)

\* **Uvæ ursi folia.** Im Decoct 10,0—20,0:200,0; in Species 1—2 Esslöffel auf 2—3 Tassen.

Rp. Decoct. fol. uvæ ursi 10,0—15,0 : 200,0.

DS. 2stdl. 1 Essl.

(Cystitis, Blasenblutung, Nephritis.)

**Valerianæ radix.** Im Infus 10,0—20,0 : 200,0.

Rp. Inf. rad. Valerian. 10,0—15,0 : 180,0.

Spirit. æther.-nitros. 2,0.

Syrup. simpl. 20,0.

DS. 2stdl. 1 Essl.

(Excitans, Nervinum.)

*Tinctura valerianæ.* Zu 20—30 Tropfen mehrmals.  
(Antihystericum.)

*Tinctura valerianæ ætherea.* Mehrmals 10—20 Tropfen.  
(Analepticum.)

† *Elæosaccharum valerianæ.* Als Corrigens zu Pulvern.

**Veratrinum.** In Pillen und Salben.

ad 0,005 pro dosi!

ad 0,03 pro die!

Rp. Veratrini 0,06.

Extr. Opii 0,1.

Gummi mimos. q. s.

ut. f. Pill. Nr. 30. obduc. argent. foliat.

DS. 3 × tgl. 1—2 Pill.  
(Pneumonie.)

Rp. Veratrii 0,15.

Adip. suilli 15,0.

Mf. Ungtm.

DS. Aeusserlich.  
(Neuralgie.)

† **Vinum chinæ.** 2—3 stündlich 1 Esslöffel.

† **Vinum Ungaricum.**

† **Vinum Hispanicum Malacense.** Malagawein.

† **Vinum Pepsini.** S. Pepsin.

(Roborans  
und  
Excitans.)



\* **Zincum sulphuricum.** Aeusserlich, in Solution zu Einspritzungen und Waschungen.

ad 0,06 pro dosi!

ad 0,3 pro die!

ad 1,2 pro emetico refracta dosi.

Rp. Sol. Zinci sulph.  
0,5—1,5 : 150,0.

DS. Aeusserlich.  
Zu Einspritzungen.  
(Gonorrhoe, Otorrhoe.)

Rp. Sol. Zinci sulph. 0,06 : 30,0.  
DS. Aeusserlich.

(Einige Tropfen in den Con-  
junctivalsack zu bringen.)  
(Conjunctivitis.)

*Unguentum Zinci.* Aeusserlich.

† **Zincum Valerianicum.** In Pulvern und Pillen.

ad 0,06 pro dosi!

ad 0,3 pro die!

Rp. Zinci Valerian. 0,03.  
Sacch. alb. 0,3.  
Mf. Pulv. d. t. dos. X.  
DS. 3 × tgl. 1 Pulv.

Rp. Zinci Valerian. 1,0.  
Rad. Valerian. 2,0.  
Gummi Tragacanth. q. s.  
ut. f. Pill. Nr. 30.  
DS. 3 × tgl. 1—2 Pill.

(Antihystericum.)

---







THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968



## 4. Anhang.

### a) Mittel zur Inhalation :

Acidum carbol.  
— lacticum.  
— tannicum.  
Alumen.  
Aqua calcis.  
Brom (mit Kali brom.).

Glycerin.  
Kalium jodat.  
Liquor ferri sesquichl.  
Lithion carbon.  
Natrium chlorat.

### b) Mittel zur subcutanen Injection :

Acidum benzoicum.  
Apomorphin.  
Atropin sulphur.  
Camphora.  
Chinium muriat.  
Chloral. hydr.

Ergotin.  
Hydrargyr. bichlor. corros.  
Morphin. hydrochlor.  
Strichnium nitric.  
Tinctura Jodi.

### c) Uebersicht der wichtigsten Bäder und Kurorte.

#### I. Seebäder.

- 1) **Ostseebäder** : Cranz, Zoppot, Colberg, Dievenow, Misdroy, Swinemünde, Heringsdorf, Putbus, Döberan, Travemünde, etc.
- 2) **Nordseebäder** : Helgoland, Wangeroog, Nordeney, Borkum, Scheveningen, Blankenberghen, Ostende, etc.
- 3) **Französische Seebäder** : Calais, Boulogne, Dieppe, Havre, Trouville, Biarritz, etc.
- 4) **Englische Seebäder** : Hastings, Brighton, Isle of Wight (Ventnor, Ryde), etc.

#### II. Soolbäder.

Rheinfelden (Schweiz).  
Ischl (Salzkammergut).  
Salzungen (Sachsen-Meiningen).  
Hall (Tyrol).  
Jaxtfeld (Württemberg).  
Frankenhausen (Schwarzburg-Rudolstadt).  
Colberg (Pommern).  
Kösen (Prov. Sachsen).  
Wittekind (bei Halle).  
Dürkheim (Pfalz).  
Nauheim (Hessen-Darmstadt).  
Rheme (Oeynhausen - Westphalen).



### III. Kochsalzmineralquellen.

Burtscheid (Rheinprovinz).  
 Baden-Baden (Grossh. Baden).  
 Homburg (bei Frankfurt a/M.).  
 Wiesbaden (Nassau).  
 Kissingen (Baiern).

### IV. Jod- und bromhaltige Soolen.

Adelheidsquelle } bei Tölz in  
 Krankenheil } Baiern.  
 Hall (Oberösterreich).  
 Königsdorff-Jastrzemb (Schle-  
 sien).  
 Kreuznach (Rheinprovinz).

### V. Schwefelbäder.

Aachen (Rheinprovinz).  
 Baden (bei Wien).  
 Nenndorf (bei Hannover).  
 Weilbach (Nassau).  
 Langenbrücken (Baden).  
 Baden }  
 Schinznach } Schweiz.

### VI. Indifferente Thermen (Wildbäder).

Landeck }  
 Warmbrunn } Schlesien.  
 Schlangenbad (Nassau).  
 Wildbad (Württemberg).  
 Teplitz (Böhmen).  
 Gastein (Oesterreich).  
 Pfäfers }  
 Ragaz } Schweiz.  
 Plombières (Frankreich).

NB. Wegen der ihr zugeschrie-  
 benen Wirkung schliesst sich hier  
 an: die Grotte **Monsummano** (bei  
 Pistoja in Italien).

### VII. Eisen- und Stahlbäder.

Pyrmont }  
 Wildungen } Waldeck.  
 Alexisbad (Anhalt).  
 Driburg (Westphalen).  
 Liebenstein (Sachsen-Mei-  
 ningen).  
 Schwalbach (im Taunus).  
 Reinerz }  
 Cudowa } Schlesien.  
 Griesbach }  
 Petersthal } Baden.  
 Rippoldsau }  
 Franzensbad (Böhmen).  
 Tarasp-Schuls }  
 Saint-Moritz } Schweiz.  
 Spa (Belgien).

### VIII. Alkalische Mineralwässer.

Selters }  
 Ems } Regbz. Wiesbaden.  
 Neuenahr (Rheinpreussen).  
 Fachingen (im Taunus).  
 Salzbrunn (Schlesien).  
 Bilin }  
 Giesshübel } Böhmen.  
 Vichy (Frankreich).

### IX. Salinische Mineralwässer.

Franzensbad }  
 Marienbad }  
 Carlsbad } Böhmen.  
 Püllna }  
 Saldschütz }  
 Sedlitz }  
 Friedrichshall (Sachsen-Mei-  
 ningen).  
 Kissingen (Baiern).  
 Rippoldsau (Baden).  
 Tarasp-Schuls (Schweiz).



1. The first part of the report  
deals with the general situation  
of the country and the  
state of the economy.

2. The second part of the report  
deals with the results of the  
survey and the conclusions  
drawn from it. The survey  
was conducted in the  
month of June and the  
results were as follows:  
The first part of the survey  
deals with the general situation  
of the country and the  
state of the economy.

3. The third part of the report  
deals with the results of the  
survey and the conclusions  
drawn from it. The survey  
was conducted in the  
month of June and the  
results were as follows:  
The first part of the survey  
deals with the general situation  
of the country and the  
state of the economy.

4. The fourth part of the report  
deals with the results of the  
survey and the conclusions  
drawn from it. The survey  
was conducted in the  
month of June and the  
results were as follows:

| The                              |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. The first part of the report  | deals with the general situation     |
| 2. The second part of the report | deals with the results of the survey |
| 3. The third part of the report  | deals with the results of the survey |
| 4. The fourth part of the report | deals with the results of the survey |



III. Die geographische Lage

Die geographische Lage ist von großer Wichtigkeit für die Beurtheilung der klimatischen Verhältnisse. Die Lage des Ortes ist im Allgemeinen sehr günstig.

IV. Die klimatischen Verhältnisse

Die klimatischen Verhältnisse sind im Allgemeinen sehr günstig. Die Temperatur ist im Sommer sehr hoch, im Winter sehr niedrig. Die Luftfeuchtigkeit ist im Sommer sehr hoch, im Winter sehr niedrig.

V. Die klimatischen Verhältnisse

Die klimatischen Verhältnisse sind im Allgemeinen sehr günstig. Die Temperatur ist im Sommer sehr hoch, im Winter sehr niedrig. Die Luftfeuchtigkeit ist im Sommer sehr hoch, im Winter sehr niedrig.

VI. Die klimatischen Verhältnisse

Die klimatischen Verhältnisse sind im Allgemeinen sehr günstig. Die Temperatur ist im Sommer sehr hoch, im Winter sehr niedrig. Die Luftfeuchtigkeit ist im Sommer sehr hoch, im Winter sehr niedrig.

Die klimatischen Verhältnisse sind im Allgemeinen sehr günstig. Die Temperatur ist im Sommer sehr hoch, im Winter sehr niedrig. Die Luftfeuchtigkeit ist im Sommer sehr hoch, im Winter sehr niedrig.

III. Die geographische Lage

Die geographische Lage ist von großer Wichtigkeit für die Beurtheilung der klimatischen Verhältnisse. Die Lage des Ortes ist im Allgemeinen sehr günstig.

VII. Die klimatischen Verhältnisse

Die klimatischen Verhältnisse sind im Allgemeinen sehr günstig. Die Temperatur ist im Sommer sehr hoch, im Winter sehr niedrig. Die Luftfeuchtigkeit ist im Sommer sehr hoch, im Winter sehr niedrig.

VIII. Die klimatischen Verhältnisse

Die klimatischen Verhältnisse sind im Allgemeinen sehr günstig. Die Temperatur ist im Sommer sehr hoch, im Winter sehr niedrig. Die Luftfeuchtigkeit ist im Sommer sehr hoch, im Winter sehr niedrig.



### X. Traubenkurorte.

Dürkheim (in der Pfalz).  
Grünberg (Schlesien).  
Montreux } am Genfer See.  
Vevey }  
Bozen und Meran (Tyrol).

### XI. Kurorte für Lungen- kranke.

Charlottenbrunn, Görbers-  
dorf, Reinerz, Salzbrunn  
(Schlesien).  
Lippspringe, Soden, Ems,  
Wiesbaden, Baden-Baden,  
Badenweiler (Rheinlande).  
Reichenhall, Kreuth (Baiern).  
Ischl (Salzkammergut).  
Appenzell, Interlaken, Davos,  
Montreux, Vevey, Bex  
(Schweiz).  
Meran, Riva, Arco (Tyrol).  
Pau, Mentone, Cannes, San  
Remo, Nizza (Süd-Frank-  
reich).  
Venedig, Pisa, Rom, Palermo  
(Italien).  
Ajaccio (Corsica).

Malaga (Spanien).  
Isle of Wight (England).  
Madeira, Cairo, Algier.

Anmerkung. **Pneumatische  
Cabinete**: Schöneberg (bei Ber-  
lin), Dresden, Frankfurt, Nassau,  
Ems, Wiesbaden, Reichenhall,  
etc.

### XII. Kaltwasserheilanstalten.

Nassau.  
Laubbach (bei Coblenz).  
Godesberg (bei Bonn).  
Marienberg }  
Mühlbad } am Rhein.  
Johannisberg }  
Dietenmühle (bei Wiesbaden)  
Gleisweiler (bei Landau).  
Liebenstein } Thüringer Wald  
Ilmenau }  
Alexandersbad (Fichtelge-  
birge).  
Königsbrunn } bei Dresden.  
Tharand }  
Pelonken (bei Danzig).  
Reimansfelde (bei Elbing).  
Teinach (im Schwarzwald).  
Rigi-Kaltbad (Schweiz).

### d) Maximal-Dosen

der Arzneimittel, welche der Arzt nicht überschreiten darf,  
ohne ein Ausrufungszeichen hinzuzufügen.

|                                     | Pro   |      |
|-------------------------------------|-------|------|
|                                     | Dosi. | Die. |
| Acidum arsenicosum. . . . .         | 0,005 | 0,01 |
| Acidum carbolicum cryst. . . . .    | 0,05  | 0,15 |
| Aconitinum. . . . .                 | 0,004 | 0,03 |
| Aqua amygdalarum amararum . . . . . | 2,0   | 7,0  |
| Aqua Laurocerasi . . . . .          | 2,0   | 7,0  |



|                                              |  | Pro   |       |
|----------------------------------------------|--|-------|-------|
|                                              |  | Dosi. | Die.  |
| Argentum nitricum. . . . .                   |  | 0,03  | 0,2   |
| Atropinum, Atropin. sulphur. . . . .         |  | 0,001 | 0,003 |
| Auro-Natrium chloratum. . . . .              |  | 0,06  | 0,2   |
| Baryum chloratum . . . . .                   |  | 0,12  | 1,5   |
| Cantharides . . . . .                        |  | 0,05  | 0,15  |
| Codeinum . . . . .                           |  | 0,05  | 0,1   |
| Coniinum . . . . .                           |  | 0,001 | 0,003 |
| Cuprum sulphuricum . . . . .                 |  | 0,1   | 0,4   |
| Cuprum sulphuricum pro emetico refracta dosi |  | 1,0   | »     |
| — — ammoniatum . . . . .                     |  | 0,1   | 0,4   |
| Extractum Aconiti . . . . .                  |  | 0,025 | 0,1   |
| — Belladonnæ . . . . .                       |  | 0,1   | 0,4   |
| — Cannabis Indicæ. . . . .                   |  | 0,1   | 0,3   |
| — Colocynthis . . . . .                      |  | 0,06  | 0,4   |
| — Conii . . . . .                            |  | 0,18  | 0,6   |
| — Digitalis . . . . .                        |  | 0,2   | 0,8   |
| — Fabæ Calabaricæ. . . . .                   |  | 0,02  | 0,06  |
| — Hyoscyami. . . . .                         |  | 0,2   | 1,0   |
| — Lactuæ . . . . .                           |  | 0,6   | 2,5   |
| — Opii . . . . .                             |  | 0,1   | 0,4   |
| — Pulsatillæ . . . . .                       |  | 0,2   | 1,0   |
| — Sabinæ . . . . .                           |  | 0,2   | 1,0   |
| — Stramonii . . . . .                        |  | 0,1   | 0,4   |
| — Strychni aquosum . . . . .                 |  | 0,2   | 0,6   |
| — — spirituosum. . . . .                     |  | 0,05  | 0,15  |
| Folia Belladonnæ . . . . .                   |  | 0,2   | 0,6   |
| — Digitalis . . . . .                        |  | 0,3   | 1,0   |
| — Hyoscyami . . . . .                        |  | 0,3   | 1,0   |
| — Stramonii . . . . .                        |  | 0,25  | 1,0   |
| — Toxicodendri . . . . .                     |  | 0,4   | 1,2   |
| Fructus Colocynthis præparati. . . . .       |  | 0,3   | 1,0   |
| — Sabadillæ. . . . .                         |  | 0,25  | 1,0   |
| Gutti . . . . .                              |  | 0,3   | 1,0   |
| Herba Conii. . . . .                         |  | 0,3   | 2,0   |
| Hydrargyrum bichloratum corrosivum . . . . . |  | 0,03  | 0,1   |
| — bijodatum rubrum . . . . .                 |  | 0,03  | 0,1   |
| — jodatum flavum . . . . .                   |  | 0,06  | 0,4   |
| — nitricum oxydulatum . . . . .              |  | 0,015 | 0,06  |











|                                               | Pro   |      |
|-----------------------------------------------|-------|------|
|                                               | Dosi. | Die. |
| Hydrargyrum oxydatum rubrum . . . . .         | 0,03  | 0,1  |
| Kreosotum . . . . .                           | 0,05  | 0,2  |
| Lactucarium . . . . .                         | 0,3   | 1,2  |
| Liquor Hydrargyri nitrici oxydulati . . . . . | 0,1   | 0,5  |
| — Kali arsenicosi . . . . .                   | 0,4   | 2,0  |
| Morphinum . . . . .                           | 0,03  | 0,12 |
| Morphinum aceticum, hydrochloricum, sulphur.  | 0,03  | 0,12 |
| Oleum Crotonis. . . . .                       | 0,06  | 0,3  |
| Opium. . . . .                                | 0,15  | 0,5  |
| Phosphorus. . . . .                           | 0,015 | 0,06 |
| Plumbum aceticum. . . . .                     | 0,06  | 0,4  |
| Radix Belladonnæ . . . . .                    | 0,1   | 0,4  |
| — Hellebori viridis. . . . .                  | 0,3   | 1,2  |
| Santonium. . . . .                            | 0,1   | 0,5  |
| Semen Strychni . . . . .                      | 0,1   | 0,3  |
| Strychninum und Strychninum nitricum . . . .  | 0,01  | 0,03 |
| Tartarus stibiatus . . . . .                  | 0,2   | 1,0  |
| Tinctura Aconiti . . . . .                    | 1,0   | 4,0  |
| — Belladonnæ . . . . .                        | 1,0   | 4,0  |
| — Cantharidum . . . . .                       | 0,5   | 1,5  |
| — Colchici. . . . .                           | 2,0   | 6,0  |
| — Colocynthis. . . . .                        | 1,0   | 3,0  |
| — Digitalis. . . . .                          | 2,0   | 6,0  |
| — Digitalis ætherea. . . . .                  | 1,0   | 3,0  |
| — Jodi . . . . .                              | 0,3   | 1,2  |
| — Opii crocata. . . . .                       | 1,5   | 5,0  |
| — Opii simplex . . . . .                      | 1,5   | 5,0  |
| — Stramonii. . . . .                          | 1,0   | 3,0  |
| — Strychni . . . . .                          | 0,5   | 1,5  |
| — Toxicodendri . . . . .                      | 1,0   | 3,0  |
| Tubera Aconiti . . . . .                      | 0,15  | 0,6  |
| Veratrinum. . . . .                           | 0,005 | 0,03 |
| Vinum Colchici. . . . .                       | 2,0   | 6,0  |
| Zincum chloratum . . . . .                    | 0,015 | 0,1  |
| — lacticum . . . . .                          | 0,06  | 0,3  |
| — sulphuricum. . . . .                        | 0,06  | 0,3  |
| — — pro emetico refracta dosi .               | 1,2   | „    |
| — valerianicum . . . . .                      | 0,06  | 0,3  |



C. F. Schmidt's Universitäts-Buchhandlung  
(Friedr. Bull), in Strassburg, empfiehlt ihr  
Lager der vorzüglichsten

**medizinischen**

**Lehr- und Handbücher,**

und steht der Catalog derselben gratis zur Ver-  
fügung.



















Rabow, Siegfried,

<<Die>> gebräuchlichsten Arzneiverordnungen der medicinischen Klinik und  
Poliklinik zu Strassburg

Strassburg 1874

Bamberg, Staatsbibliothek -- Mat.med.o.154-a  
urn:nbn:de:bvb:12-bsb11740417-0